

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

普濟方卷三百二十六

詳校官太醫院恩糧臣孔毓秀

編修臣倉聖脈覆勘

總校官進士臣楊恩珩

校對官中書臣吳甸華

謄錄監生臣沈浩

欽定四庫全書

普濟方卷三百二十六

明

周王朱橚

撰

婦人諸疾門

脚氣

附論

夫婦人脚氣與丈夫不同男子則腎臟虛弱為風濕所乘女子以胞絡氣虛為毒所搏是以胞絡屬於腎也腎主於腰脚又肝脾腎三臟經絡起於十足指若臟腑虛損則風邪先客於脚從上而下動於氣故名脚氣也此

皆由體虛或當風取涼或久坐界濕或產後勞損或志
怒傷肝心氣滯致令月候不通因其虛傷風毒搏於肌
骨則令皮膚不仁筋骨抽痛五緩不遂六急拘攣或即
冷痛或即腫滿兩脚痺弱或舉體轉筋目眩心煩見食
即吐精神昏憤肢筋煩疼小便赤黃大便秘澀並皆其
證也其婦人脚氣治之與丈夫不同者以其氣血不調
懷胎難產崩傷之異是以褚澄療寡婦師尼與妻妾殊
別即其義也凡婦人有脚氣疾者必無生育

凡頭痛身熱肢節疼大便秘或嘔逆而脚屈弱者脚氣也輕者可與香蘇散加木瓜檳榔生薑煎服然後隨證治之要知有脚氣之人先從脚起或先緩弱疼痺或行起忽倒或兩脛腫滿或脚膝枯細或心中忪悸或小腹不仁皮頑不知有無也或舉體轉筋或見食嘔逆惡聞食氣或胸滿氣急或遍體痠疼皆脚氣候黃帝所謂緩風濕痺是也頑若名緩風疼痛為濕痺寒中三陽所患必冷小續命湯主之煎成入生薑自然汁最甚快暑中三

陰所患必熱小續命湯去附子減桂一半主之大煩躁者紫雪最良若無紫雪以百合薄荷煎冷水調服極妙大便秘者脾約圓麻仁圓三和散主之仍針灸為佳服補藥與湯淋洗皆醫之大禁也又云若產後熱悶氣上轉為脚氣者蓋由產卧血虛生熱復因春夏取涼過多地之蒸濕因足履之所以著為脚氣其狀熱悶掣癢驚悸心煩嘔吐氣上皆其候也可服小續命湯兩三劑必愈若誤以逐敗血藥攻之則血去而疾益增矣陳無擇

謂脚氣固是常病未聞產後能轉為者往往讀千金見
產婦多有此疾之語便出是證設是熱悶氣上如何便
服小續命湯此藥本主少陽經中風非均治諸經脚氣
要依脚氣方論陰陽經絡調之

方

紫蘇散 治婦人風毒脚氣腹內壅塞痰惡不思飲食
脚腫虛腫並皆治之

紫蘇

葉

木通

桑白皮

茴香根

各一兩

枳殼

二兩

川

羌活 獨活 荊芥穗 木瓜 青皮 各半兩 大腹

子 十個 甘草 半兩

右㕮咀每服三錢水一盞薑三片葱白一莖煎至七分去滓溫服佳

薏苡仁散 治婦人脚氣緩弱及頑痺腫滿心下急大便澀

薏苡仁 防風 猪苓 川芎 防己 檳榔

郁李仁 大麻仁 各一兩 桑白皮 三兩 枳實 三分 甘草 半兩

羚羊角屑

一兩

右為散每服三錢水一盞煎至七分去滓放溫服

牛膝散 治婦人脚氣浮腫心神煩悶月信不通

川牛膝 羚羊角 檳榔 大黃 芒硝

各一兩

防

己 桂心 牡丹皮 赤芍藥 甘草 桃仁

各三兩

五粒
梨

右為粗末每服三大錢水一盞煎至七分去滓溫服
利下惡物為度亦要相其強弱用之一方有當歸三

分

防風散 治婦人脚氣腫滿疼痛筋脉拘急

防風

一兩去蘆頭

五加皮

二兩

薏苡仁

二兩

羌活

一兩

附子

一兩

炮去皮臍

酸棗仁

一兩微炒

枳實

三分麩炒微黃

甘草

半兩炙微赤判

芎藭

一兩 川大黃

三兩判碎微炒

當歸

一兩判微炒

羚羊角屑

一兩

右為散每服四錢水一中盞煎至七分去滓食前溫

服

大腹皮散

一名大腹子散

治婦人風毒脚氣肢節煩疼心神壅

悶

大腹皮

一作大腹子

紫蘇

木通

桑白皮

羌活

荊芥

赤芍藥

青皮

木瓜

獨活

各一兩

枳殼

二兩

右呖咀每服四錢水一盞薑五片葱白七寸煎至七分去滓空心溫服

赤茯苓散 治婦人脚氣腫滿腹內妨悶月水不通四肢疼痛服之

赤茯苓

一兩

木通

一兩

紫蘇莖葉

一兩

牛膝

一兩

木香

半兩

防葵

半兩

檳榔

一兩

桂心

半兩

鼈甲

一兩

令黃去裙

炙

赤芍藥

半兩
川大黃

二兩

碎微炒

右為散每服四錢以水一中盞生薑半分煎至六分

去滓食前溫服惟以利為效

桑白皮散

出聖惠方

治婦人脚氣盛發兩脚浮腫小便赤澀

腹脇脹滿氣滿坐卧不得並宜治之

桑白皮

郁李仁

各一兩

木香

防己

大腹皮

各半

兩紫蘇子

木通

檳榔

青皮

各三分

赤茯苓

兩二

右咬咀每服三錢水一盞薑三片煎至七分去滓溫

服

羚羊角圓

出聖惠方

治婦人脚氣上衝喘急稍縱兩脚不仁

小腹頑痺頭面浮腫時復心悶便利常澀

羚羊角屑

兩一

漢防己

兩半

薏苡仁

兩一

牛膝

兩一

去苗

芎藭

兩一
川大黃

兩一

獨活

兩半

大麻仁

兩一

木香

兩半

郁李

兩一

仁

兩一

去皮微炒

枳實

兩一

炒微黃

右為末煉蜜和搗五七百杵丸如梧桐子大每服三十丸溫酒下食前

木香散

出聖惠方

治婦人脚氣卒發衝心悶亂

木香

半兩

郁李仁

赤芍藥

大腹皮

紫雪

各一兩

桑白皮

桂心

檳榔

茯苓

各三分

右㕮咀每服三錢水一盞薑三片煎至七分去滓溫服

紅藍花散

出聖惠方

治婦人脚氣心神煩亂

紅藍花

一兩半

柴胡

一兩半

羚羊角屑

赤芍藥

各一兩

桑根白皮

二兩

檳榔

紅雪

各二兩

甘草

三分炙

紫

蘇莖葉

一兩

右為散每服四錢水一中盞入生薑半分煎至六分

去滓溫服不計時候

牛膝散

出聖惠方

治婦人脚氣緩弱無力兼軟風

牛膝

一兩

附子

炮裂去皮臍

仙靈脾

萆薢

羌活

防風

去蘆頭

大腹皮

剉各一兩

桑根白皮

剉二兩

郁李仁

一兩

湯浸去
皮微炒

右為末每服四錢水一中盞入黑豆五十粒生薑半
分煎至六分去滓每於食前溫服

木瓜丸

出聖惠方

治婦人脚氣衝心悶亂腹脇脹滿不能下

食

木瓜

二枚蒸熟去皮子

木香

一兩兩 檳榔

草苳蔻

一兩去皮

青橘

皮

湯浸去白穢焙

桂心

各三分

當歸

判微炒

郁李仁

湯浸去皮微炒各半

兩

桃仁

一兩兩湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃

右為末煉研木瓜和丸如梧桐子大溫酒下三十丸

不計時候

半夏散

出聖惠方

治女人脚氣發動心腹脹滿飲食下嘔下

逆不止

半夏

陳皮

人參

大腹皮

桂心

各三分

檳榔

一兩赤茯苓

紫蘇

各一兩半

右㕮咀每服四錢水一盞半薑三片煎至七分去滓

溫服一方有木通

犀角散

出聖惠方

治女人脚氣忽發衝心悶亂四肢煩疼有

熱者

犀 屑 木香

各半兩

紫蘇莖葉

白茯苓

檳榔

各一兩

赤芍藥

紅花

各三分

紅雪

一兩半

右呶咀每服四錢水一盞煎至七分去滓溫服

坐拏散

出聖惠方

治婦人脚氣厥冷血氣不調

坐拏

一兩

狼毒

一兩

沈香

紫蘇子

羌

活 羅蔔子

微炒

杉木節

各三分

桂心

半兩

右為散每服用水煎木瓜紫蘇莖葉湯調下二錢每

於食前服

蒼朮丸

出永類
鈴方

治自諸證退後只有脚攣痛不能行以

蒼朮丸治之効此藥大治乾濕脚氣筋脈拘攣疼痛

不能行履兼補下部

乳香

沒藥

各二錢
另研

川牛膝

青鹽

各半
兩研

熟艾

四錢

川烏

三錢

全蝎

一錢
炒

右除研藥為細末入研藥令停以木瓜一個大者切

一頭留作蓋去穰入上件藥於木瓜內將蓋簽定安木瓜於黑豆中蒸令極爛取出去皮連藥研成膏却入生蒼朮末拌勻得所丸如梧桐子大每服五十丸空心用木瓜湯下或溫鹽酒亦得一日三服忌血與蒜葱等物如大便秘者可與七宣丸神功丸七聖檳榔丸三和散服効昔有婦人病發熱自汗心煩身體骨立足痛拘攣不能屈伸飲食不進雖老醫亦不能療因治之見六脉弱似勞實非勞也似脚氣非止脚

氣但當調脾生血其熱必退然後見功足則可望安遍
尋諸方皆無對証之藥遂處四白散子與服不半劑
熱退能食又處蒼朮丸繼之筋脈伸足能行而愈

治婦人脚氣衝心悶亂不識人宜服此藥

出聖惠方

紫蘇莖葉

松節

各二兩

吳茱萸

半兩

檳榔

乾木瓜

各一分
陳皮

右㕮咀每服四錢水一盞煎至一半入童子小便二
合再煎三沸溫服

紅雪散

出聖惠方

治女人脚氣臟腑氣壅胸膈滿悶脚膝煩

痛

紅雪

一兩半

赤芍藥

半兩

茜根

半兩

桂心

一兩

生乾地黄

一兩紅藍花

三分

右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓食前

溫服

治婦人脚氣卒發衝心煩悶氣急大便苦難小便赤澀

心神熱燥宜服

出聖惠方

紅藍花

三分

生黑豆皮

二分

合川大黃

三分剉碎微炒

右以水一盞半煎至一盞去滓食前分溫三服

治脚赤腫

出聖惠方

荊芥

石膏

地龍

炒

薄荷

右剉散生薑三片蜜少許煎服

腰脚疼痛

附論

夫腎主於腰脚女人腎臟繫於胞絡若勞傷腎氣虛弱而風冷客於胞絡邪氣與真氣交爭故令腰脚疼痛也

凡婦人腰膝痛兩脚麻木惡寒喜煖內經曰風寒濕合而為痺先可服除濕丹七八十丸量虛實以意加減次以禹功散投之瀉十餘行清冷積水青黃涎沫為驗復用長流水煎生薑棗同五苓散服之風濕散而氣血自和也

方

附子丸

出聖惠方

治婦人血風流注腰脚骨節痠疼不可忍

附子

三分炮裂去皮臍

牛膝

一兩去苗

海桐皮

剉

桂心

延胡

索 安息香各半兩 天麻 羚羊角屑 芎藭 當

歸各三 白芷半兩 木香半兩 乾蝎一分 酸棗仁三分 羌

活三分 防風三分 漏蘆一兩

右為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每於食

前以暖酒下三十丸

虎骨丸出聖惠方 治婦人血風流注腰脚骨節疼痛不可忍

虎脰骨塗酥炙令黃 檳榔 敗龜塗酥炙令黃各一兩 防風去蘆頭

附子炮裂去皮臍 赤芍藥 麒麟竭各半兩 當歸 川大

黃

剉碎微炒三分

桂心

沒藥

地龍

炒令微黃各半兩

牛膝

一兩

去苗

木香

海桐皮

剉

桃仁

湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃各三分

右為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每於食

前溫酒下二十丸

酸棗仁散

出聖惠方

治婦人血氣風虛腰脚疼痛頭目昏悶

食少無力者服之

酸棗仁

炒

川牛膝

當歸

各三分

羌活

川芎

桂

心防風

木香

海桐皮

杜仲

續斷

粉

草

附子

萆薢

各二分

右㕮咀每服四錢水一盞半薑三片煎至七分去滓

溫服

骨碎補散

出聖惠方

治婦人血風氣攻腰脚疼痛脇拘急

肢節不利宜服

骨碎補

炒

萆薢

川牛膝

去苗

桃仁

湯浸去皮尖麩炒黃

附子

炮製去皮臍

川芎

各三分

枳殼

半兩一作枳實

右為粗末三錢水大盞薑三片棗一個煎至七分去

淳食前熱服一方無棗

仙靈脾散

出聖惠方

治婦人血氣攻注腰脚疼痛

仙靈脾

一兩

羌活

海桐皮

牛膝

去苗

當歸

芍藥

骨碎補

去毛

延胡索

桂心

木香

各三分

桃仁

一兩湯浸

去皮尖雙仁
麩炒微黃

菴藺子

枳殼

各三分

檳榔

一兩

蚬蚶

微炒麝香

一分細研入

右為細散每服食前以豆淋酒調下一錢

藁本散

出聖惠方

治婦人血風流注腰脚疼痛不可忍宜服

藁本一兩半 狗脊一兩去毛 沒藥 天麻 麒麟竭 蟬

殼微炒 骨碎補 桂心各一兩 虎脰骨 敗龜 穿山

甲已上各二兩各醋塗炙令黃焦 麝香半兩研入

右為細散每服少生薑黑豆淋酒下二錢空心服

草薢丸出聖惠方 治婦人血風腰脚骨節痠疼筋脈拘急行

履艱難兩脇抽痛

草薢剉 牛膝去苗 當歸 石斛去根 附子炮裂去皮

虎脰骨一兩半塗酥炙令黃 防風去蘆頭 丹參 赤芍藥 桂

心 酸棗仁

杜仲去粗皮炙黃
剉各三分

右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每日空心及晚食前以溫酒下三十丸

琥珀散

出聖惠方

治婦人血風攻注腰脚疼痛經絡滯澁四

肢煩疼宜服之

琥珀

牛膝

去苗

當歸

凌霄花

赤芍藥

沒藥

各一兩地龍

半兩

水蛭

一兩炒令黃焦

麝香

一分細研入

桃仁

一兩

半湯浸去皮尖雙仁麝炒微黃

右為細散每服食前以溫酒調下二錢

敗龜散

出聖惠方

治婦人風毒流注腰脚疼痛行立艱難

敗龜

二兩塗醋炙令黃

白僵蚕

一兩微炒

沒藥

半兩

薏苡仁

當

歸

剉微炒

杜仲

去粗皮炙微黃剉各一兩

桂心

乳香

地龍

微炒

各三分去土用

虎脰骨

二兩塗酥炙令黃

右為細散每於食前以暖薄荷酒調下二錢

牛膝散

出聖惠方

治婦人腰脚風冷疼痛久不瘥

牛膝

去苗

敗龜

塗醋酥炙令黃各二兩

虎脰骨

塗酥炙令黃

沒藥

羌活 當歸

桂心

各一兩

右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每於食

前溫酒下三十丸

海桐皮丸

出聖惠方

治婦人腰脚風冷疼痛行立無力宜服

海桐皮

剉

牛膝

去苗

熟乾地黄

杜仲

去粗皮炙微

黃剉各一兩

桂心

石斛

去根剉各三兩

右搗羅煉蜜丸如梧桐子大每於空心及晚食前以

溫酒下三十丸

附子散

出聖惠方

治女人腰脚積年疼痛不瘥

附子

炮裂去皮臍

桂心

各二兩

沒藥

歲靈仙

牛膝

去苗

乾漆

搗碎炒令烟出各一兩

右為細散於食前溫酒下二錢

歲靈仙散

出聖惠方

治婦人腰脚疼痛大腸不利

歲靈仙

牽牛子

微炒各二兩

木香

半兩

枳殼

一兩麩炒微黃去穰

右為細散每日空心以茶清調下二錢以利為効

腰痛

附論

夫腎主於腰女人腎臟繫於胞絡若腎氣虛弱外感六淫內傷七情皆致腰痛古方亦有五種之說如風腰痛宜小續命湯加桃仁杜仲煎服脾胃氣蔽及寒濕腰痛宜五積散加桃仁如虛損及五積腰痛者青蛾丸神應丸皆可用也如氣滯腰痛加神保丸黑牽牛茴香橘核必有功也

方

獨活寄生湯

出大全良方

夫腰痛者皆由腎氣虛弱卧冷濕

地當風所得不時速治喜流入脚膝為偏枯冷痺緩弱疼重或腰痛拘腰重痺宜急治之

獨活

三兩

桑寄生

續斷

杜仲

北細辛

川牛

膝

秦艽

茯苓

白芍藥

桂心

川芎

防

風

人參

熟地黃

當歸

各二兩

甘草

二兩炙

右呔咀每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服空心若下利除地黃并治新產腹痛不得轉動及腰脚攣痺弱不得屈伸此藥最能除風消血肘後有附子一

枚無寄生人參當歸甘草近人將治歷節風脚氣流
注亦効

如神湯

出鮑氏方

治男子婦人腰痛及產後臍下痛

延胡索

當歸

桂心

等分

右為末溫酒調下二錢甚者不過數服一方無當歸
有杜仲

虎骨散 治腰上實肉處痛不可忍

用麝香末半錢用酒調服虎骨末

治婦人患腰痛亦治卒中吐血及痔血

用向東者蘘荷根一把搗絞汁三升服之一方空心酒煎服治婦人月信滯

下部諸疾

附論

夫婦人下部諸疾其類不一陰腫者是虛損受風邪所為胞絡虛而有風邪客之風氣乘於陰與血氣相搏令氣否澁腠理壅閉不得泄越故令陰腫也胞絡勞傷子臟虛損風冷客之冷乘於陰故令冷也胞絡傷損子臟

虛冷氣下衝則令陰挺出謂之下脫亦有因產而用力
嘔氣而陰下脫者診其少陰脈浮為虛動為悸故令下
脫也陰瘡者由三蟲或九蟲動作侵蝕所為也諸虫在
人腸胃之間若臟腑調和血氣充實不能為害若勞傷
經絡腸胃虛損則動作蝕於陰輕者或痒或痛重者生
瘡診其少陰之脈滑而數者陰中生瘡也

方

當歸湯

出聖惠方

治產後臟風陰腫痛

當歸 獨活 白芷 地榆 三川敗醬 礬石

各一兩

右以水一斗半煮取五升適令煖稍稍洗陰日三兼

治陰挺下脫

治腫不收

出聖惠方

麻黃 荊芥 茄子皮 蛇床子 真杉木刺

蝟皮

各等分

右為末敷或煮水熏洗小麥朴硝白礬五倍子葱白

煮水淋洗極効

麻黃湯

出聖惠方

療婦人陰腫苦瘡熾者宜用洗之

麻黃

去節

黃連

艾

一方無艾

蛇床子

各二兩

酢梅

十枚一作烏梅

右切以水一斗煎取五升熱洗之宜避風冷

菖蒲散

出聖惠方

治女人月水澁滯陰中腫痛

菖蒲

當歸

剉微炒各一兩

秦艽

三分

吳茱萸

半兩湯浸七遍焙乾微炒

右粗搗羅為散每服三錢以水一中盞入葱白五寸

煎至六分去滓每於食前溫服

經心錄方

出聖惠方

治婦人陰中腫痛不可忍

艾葉

五兩

防風

三兩

大戟

二兩

右剉碎以水一斗煮取五升熱洗日三切宜避風冷

礬石散

出聖惠方

療婦人陰腫堅痛

礬石

二分

甘草

半分

大黃

一分

右搗篩取棗大綿纏導陰中二十日即愈

桃仁膏

出聖惠方

治產後陰腫妨悶

桃仁

去皮尖另研為膏

枯礬

五倍子

右等分為細末以膏子拌勻傅之

治產後臟中風陰腫疼方

出千金方

用搗熟桃仁傅之良日三度

治陰腫大如升脹痛不問男子婦人皆可用

出澹寮方

用馬鞭草搗汁塗之効

治婦人陰腫堅硬

出澹寮方

用枳實半斤打碎炒令熟將舊絹帛裏熨入冷則易

之又炒熱再熨

治陰門腫方

出危氏方

用甘菊苗研爛百沸湯淋洗先熏後洗

療陰中腫痛

出聖惠方

用枳殼一斤炒令熟故帛裏熨冷即換

治婦人陰腫堅痛

出聖惠方

用商陸一斤剉以水一斗煮取五升稍熱洗之日三

度

五加皮浸酒方

出聖惠方

治婦人癖瘦冷

五加皮 熟乾地黄 丹參 杜仲去粗皮炙微黃 蛇床

子 乾薑

各三兩

地骨皮

二兩

天門冬

鍾乳粉

四兩

右細剉以生絹袋盛以酒一斗五升漬二宿後每服
煖一大盞空心及晚食前服一方用枸杞子無地骨
皮

治婦人陰冷痒方

出大全良方

遠志

乾薑

生用

蓮花

各半兩

蛇床子

五味子

各一兩

右搗羅為末每用先以免糞塗陰門中用綿裹一錢

內陰中熱即為効

又方

蛇床子

三分

甜葶藶

各半兩

吳茱萸

半兩

沒石子

一枚

右搗羅為末綿裹聚許大內陰中令腹內熱為度

又方

蛇床子

一兩

吳茱萸

半兩

生用

右搗羅為末煉蜜和丸如酸棗大以綿裹內陰中下惡物以瘡為度一方用麝香

治溫中坐藥

用蛇床子為末白粉少許和勻相得如棗大綿裹內之自然溫矣甚効

三茱丸 治陰中生一物甚大牽引腰腹膨痛至甚不思飲食皆因多服熱藥及煎燂或犯非理房事兼意淫不遂名陰挺

食茱萸

吳茱萸

湯浸微炒

桔梗

水浸一伏時漉出漫火炒

白蔞

青皮

去口

山茱萸

去核取肉微炒

舶上茴香

淘去砂土焙乾各一兩

五

味子

海藻

洗焙

大腹皮

酒洗過
晒乾用

川棟子

去核

玄胡索

各一兩
二錢半

右為末酒糊丸如梧桐子大每服三十五丸木通湯
下下虛加川烏炮去玄皮肉桂去粗皮各一兩腰腹
痛甚加桃仁可去皮尖麩炒別研用再加青皮去白
枳實去穰各一兩真南木香七錢半服之一方每服
二錢生地黃湯調仍用金毛狗脊五倍子白礬水楊
根魚腥草川黃連各一兩為散分作四服以有紫瓦

罐煎熟預以銀錫作一長小筒下透罐嘴背上貫挺
上先熏後洗立効再服白薇散凌霄花少許煎

一捻金丸 服前藥未効却用

玄胡索

舶上茴香

吳茱萸

炒

川楝子

去核

青木

香

各二兩

右為末粳米糊丸如梧桐子大每服三十五丸空心
木通湯服又用梅花腦子半錢鐵孕粉一錢水調刷
上如陰畔生疤以涼血飲每服三錢加凌霄花少許

煎空心服見効

黃芩散 治婦人陰脫挺出

黃芩

蛭皮

災微焦

當歸

各半兩

芍藥

一兩赤

牡蠣

竹

皮

各二兩 狐莖

一具一用松皮

右治下篩飲服方寸匕日三禁舉重房勞冷食一方

以酒服二錢妙

硫黃散 治產蓐努用力太過陰迸下脫

硫黃

烏賊魚骨

各半兩

五味子

三銖一作五倍子

右治下篩以粉其上良日再三粉之

當歸散 治同前

當歸

劉微炒

黃芩

各二兩

蛭皮

半兩

牡蠣

二兩半燒為粉

芍藥

一兩

六銖

右治下篩酒服方寸匕日三服禁舉重良方食前煖

酒調下二錢

治婦人陰挺出下脫方

皂莢

去皮炙黃焦

半夏

炒令黃

大黃

細辛

各一兩

蛇床子

一兩
半

右搗羅為末薄絹袋盛如指長內陰中日二易之

硫黃湯 治產勞玉門開而不閉

硫黃

四兩

吳茱萸

一兩

兔絲子

一兩

六銖

蛇床子

一兩

右為散以水一升煎二方寸匕洗玉門日再洗

磁石散 治子宮不收名痼疾有痛不可忍者

用磁石酒浸火燒為末糯米粥丸梧子大每服二十

丸空心滑石湯下一方為散溫酒調服一錢治陰挺

出下脫

鐵粉散 治同前

當歸

磁石

酒浸 鐵粉 各等分

右為末米飲調下隔夜用角藥次日服此角藥用鐵屑螺青為末磨刀水調下

治婦人陰挺出下脫方

桂心

一方作川椒

吳茱萸

一兩生用

戎鹽

二兩

右藥並熬令色變搗羅為末以綿裹如指大內陰中

日再易之甚妙

又方

川椒

生用

川烏頭

生用

白芨

各半兩

右搗羅為末綿裹一錢內陰中深三寸腹中熱即止
來日再用之

又方

蛇床子

五兩

烏梅

二七枚

右以水五升煮取三升去滓稍熱洗之每日夜三五

度用

又方

川烏頭

生用

白芨

各一兩

右搗羅為末綿裹一錢內陰中令入三寸腹內熱即止來晨再用

又方

出聖惠方

硫黃

烏賊骨

各半兩

右搗羅為末傳之

又方

出聖惠方

用鐵精細研以羊脂調布裏灸令熱熨之以瘥為度

治產後陰下脫方

出聖惠方

用蛇床子一升布裏灸熨之亦治產後陰中痛

又方

出聖惠方

用弊筆頭燒為灰酒服方寸匕食前服

治產後陰道開而不閉此因產室失於遮護致風入產

門截勝湯

出千金方

用石灰一斗熬冷燒草以水二斗投之適寒溫入汁

中坐漬之須臾復易坐如常法此方已効千金不傳

治婦人陰下脫若肛方

出千金方

用羊脂煎訖適冷煖取塗上以鐵精傅之上多少令

調以火炙布令煖熨肛上漸推內之然後末磁石酒

服方寸七日三

熏洗法

出危氏方

用荊芥穗藿香葉臭椿樹皮煎湯熏洗即入

托藥

用草麻葉有九角者好飛過白礬為末以紙片攤藥

托入

摻藥

先以淡竹根煎湯洗仍用五倍子白礬為末乾摻立

効

敷藥

用溫鹽水洗軟却用五靈脂燒烟熏次用草麻子研

爛塗上俟吸入如入即洗去

療苦產門痒無計

出聖惠方

蚘蛇膽

研

雄黃

研

石硫黃

研

硃砂

研

硝石

藜蘆

蕪荑

各二分

右搗細篩重羅令調以臘月猪脂和如泥取故布作
篆子如人指長一寸半以藥塗上內孔中日一易易
時宜以猪椒根三兩煮湯洗拭乾內藥佳

三黃散

一名大黃散
出千金方

治陰中癢入骨肉

大黃 黃芩 黃耆 各一兩 芍藥 半兩 玄參 丹參

各十銖 吳茱萸 三十銖
一作山茱萸

右治下篩酒服方寸匕日三一方有蛇床子半兩亦可煎洗

治婦女陰中瘡濕痒 出聖惠方

黃連 梔子仁 甘草 黃蘗 各一兩 蛇床子 二兩

右治下篩為細末以粉瘡上無汁以猪脂和塗之深者用綿裹內瘡中日二一方無蛇床子一方無甘草

真丹散

出聖惠方

療陰痒似有蟲狀煩悶

真丹

一分研

礬石

三分燒研

芎藭

四分

右為散以穀囊盛著陰中蟲當死盡

真丹一作丹砂

浴風湯

治陰中痛痒

蛇床子

吳茱萸

湯浸七次石灰炒乾

草烏

等分

右為細末煎湯洗之三五次

治陰痒脫

出聖惠方

用礬石燒為細末每日空心調方寸匕日三服一方

陰挺出下脫

治女子陰中苦痒搔之痛悶

葛洪時後方

用猪肝炙熱內陰中當有蟲隨肝出

治女子陰癢絕產小兒瘡卵腫

用狐肉煮炙食之良

療陰癢痛不可忍

出大全良方

用蒜隨多少水煮作湯洗之日三一方用小蒜

又方

出聖惠方

猪牙二蛇床子三

兩

右以水三升煮作湯稍熱洗日三用之

又方

出大
良方全

取杏仁燒作灰乘熱綿裹內陰中良亦治女人陰中

蟲疽

療陰癢

出聖
惠方

用枸杞根一斤水三升煮汁沸適寒溫洗之

治陰癢有蟲

出聖
惠方

取雞肝去脂及熱內陰中有蟲當盡死

又方

出聖惠方

取牛肝截五寸緇繫內陰中半日蟲入肝出之豬肝亦得

療陰中有蟲癢且痛目腫身黃欲得男子漏血下白少氣思美食服此

出聖惠方

用鯉魚長一尺去頭肉取骨搗末熬黃黑以豬脂和以絹袋盛如常法內陰中至痛處即止蟲當自出

治婦人陰癢不止用小蘗不拘多少水煮作湯熱洗日

三用之

治小戶嫁痛連日

出千金方

甘草

炙

生薑

各三分

芍藥

二分

桂心

一分

右切以酒二升煮三沸去滓溫服之神良

單行大黃湯

一名大和湯
出千金方

治婦人嫁痛

用大黃三兩以酒一升煮一沸頓服

治婦人陰戶嫁痛

出千金方

用牛膝三兩酒三升煮取一升半去滓分作三服

治婦人小戶嫁痛

出大全良方

用烏賊骨燒研末酒調下方寸匕日三服一名海螵

蛸散

治婦人陰處疼痛

出危氏方

用青鹽以布裏熨之

補心湯

出危氏方

治陰中生瘡名曰蠱瘡或痛或癢如蟲行

狀淋瀝濃

白茯苓

人參

前胡

半夏

湯洗七次去滑

川芎

各三分

枳殼

炙炒去穰

紫蘇

桔梗

甘草

炙

橘紅

乾薑

各半

兩

當歸

一兩三分

白芍藥

二兩

熟地黄

一兩半

右剉散每服四錢水盞半薑五片棗一枚同煎食前

服

藿香養胃湯

出危氏方

治陽明經虛不榮肌肉陰中生瘡不

愈

藿香 白朮

白茯苓

神麴

炒

烏藥

去

縮砂仁

薏苡仁 半夏麴 人參各半兩 葷澄茄 甘草炙各

半 三錢

右剉散每服四錢水送服半薑五片棗二枚同煎不以

時候

治陰瘡方

出千金方

蕪荑 芎藭 黃芩 甘草 礬石 雄黃 附

子 白芷 黃連各六銖

右咬咀取猪膏四兩合煎傅之

治婦人陰瘡與男子妬精瘡大同小異

出危氏方

黃丹 枯白礬 扁蓄 藁本

各一兩

硫黃

半兩

白蛇

皮

一條燒灰

荊芥

蛇床子

各半兩研極細

右細末另以荊芥蛇床子煎湯溫洗軟帛溲乾清油調塗如瘡濕乾末溲之

洗搦乾草湯

出大全良方

療陰蝕

甘草

乾漆

各一兩

黃芩

乾地黄

當歸

各二兩

右細切以水七升煮取一半去滓以綿帛內湯中以

搨瘡處良久即易日二度每搨湯可行十里許即可
乾捻取勻濕散薄傳瘡上使遍可經半日又以湯搨
乾如前傳藥用五月五日蝦蟆青木香石硫黃鐵精
為末生麝香臨時加入

黃芩湯

出聖惠方

療婦人陰中生瘡洗之方

當歸

黃芩

芎藭

大黃

礬石

各三分

黃連

一分

雄黃

二分

右切以水五升煮取四升洗瘡日三度一方無雄黃

雄黃散

出聖惠方

療婦人陰中生瘡

芎藭

藜蘆

雄黃

研

丹砂

研

蜀椒

細辛

當

歸

各一分

右搗篩散取方寸匕綿裹內陰中又傳外瘡上忌如

常法

治疳瘡因月後便行房致成湛濁伏流陰道疳瘡遂生

搔癢無時先用胡椒葱白作湯一日兩三度淋洗却

服後藥

出危氏方

赤石脂

龍骨

黑牽牛

炒

兔絲子

酒浸
蒸

黃耆

鹽
水

炙
沙苑蒺藜

炒

右為末蜜丸梧桐子大每服二十九丸燕窠蒸酒澄上

清者吞下

雄黃兌散

治下部蠱瘡

雄黃

研

青箱子

苦參

黃連

各三分

桃仁

去皮尖
炒一分

右為末以生艾搗汁和如棗核綿裹內下部未効更

加扁竹汁無艾只用綿裹散子內下部亦可

陰瘡膏 治男女陰瘡方

米粉

一酒杯許

芍藥

黃芩

牡蠣

附子

白芷

各十

銖八

右咬咀以不落水猪膏一斤微炒上煎三上三下候
白芷黃膏成絞去滓內白粉和勻相得傅瘡上併治
口瘡一方無米粉

杏仁膏 治婦人陰瘡

杏仁

五兩湯浸去皮研

白芷

芍藥

生乾地黄

各一兩

猪

脂 羊髓

各三兩

右剉以猪脂羊髓拌令勻入鐺中慢火煎候白芷色黃絞去滓膏成用瓷合中貯之每取如棗大綿裹內陰中頻頻換之易瘥

黃芩散 治陰門生瘡

黃芩 當歸 川芎 白礬 黃連

各等分

右剉散煮水熏洗即安

當歸湯 治婦人陰蝕瘡凡婦人少陰脈數而滑者陰

中必生瘡名曰蠱瘡或痛或癢如蟲行狀淋露膿汁
陰蝕幾盡者此皆由心神煩鬱胃氣虛弱致氣血流
滯故經云諸痛癢瘡皆屬於心又云陽明主肌肉癢
痛皆屬於心治之當補心養胃外以熏洗坐導藥治
之乃可

當歸 芍藥 甘草 芍藥

各二兩 地榆 三兩

右細切以水五升煮取去滓熏洗旦三夜三一方用蛇
床子不用芍藥

甘濕散

又名蚬蛇膽散

療疔蟲陰蝕

蚬蛇膽

真者

青木香

末

石硫黃

鐵精

麝香

各四分臨

時分之多少入用原麝香解蛇毒若先以相和蛇膽即無力也舊用五月五日蝦蟆

右等分為末更細研有患取如三碁子和井花水日再服訖先令便利了即以後方桃枝熏下部訖然後取藥如碁子安竹管裏吹下部中亦日再度老少減量其熏法每日一度不用再為之

又療疔蟲食下部及五臟方

用取桃東南枝三七枚輕大頭使散以綿纏之又搗石硫黃為末將此綿纏枝撚轉之令末少厚又截一短竹筒先內下部中仍以所撚藥桃枝熟燃熏之療婦人陰中痛生瘡

羊脂斤一當歸

杏仁去皮尖研

白芷

芎藭各一兩

右細切羊脂和置甑中蒸之藥成取如大豆一枚綿裏內陰中日一易之

治婦人陰戶生瘡

青黛 號丹 水粉 五倍子

各為細末

右用賣肉鋪上拭肉巾燒灰為末和前藥用小絹袋入宮中滲乾如乾用荊芥薄荷栢葉煎水洗如乾仍用油調煎藥塗瘡

治婦人陰上生瘡

黃芩 海桐皮 白礬 薤菜

各等分

右煎湯洗後用破牛皮鼓燒存性細研入輕粉在內刮下雞腸上膏調藥塗瘡上如蟲喫入陰內用雞子

一個煮熟去殼塗藥末於上綿子兜入陰中如洗了
向火炙患處得癢即蟲行若身微作寒服藿香正氣
散二三服

杏仁散 治女子陰中瘡

杏仁

燒末

雄黃

礬石

燒各二分

麝香

半分

右細研為散每用少許傅瘡上以差為度一方無杏
仁

治婦人陰蝕瘡方

蒲黃一升 水銀一兩

右研勻以摻上

又方

用肥猪肉三十斤以水三石煮熟去肉入盆中浸之
冷即易不過三兩度湯令熱便洗瘡

療陰蝕欲盡者方

蝦蟆糞 兔屎

右等分為末傅瘡上良

治茄子疾心躁連綿黃水易治白水難愈

出危氏方

烏金散 二豆散

右用薑棗子煎溫服

麝香杏仁散 治婦人陰瘡

麝香

少杏仁不拘多少燒存性

右為末如瘡口深用絹袋子二個盛藥滿繫口臨上藥炙熱安在陰內立愈

治下部蟲瘡方

右以平胃散加貫衆末每用二錢熟煮猪肝拌藥入陰戶內數日可安

治陰中生瘡如蟲咬痛

出三方

用生搗桃葉綿裹納陰中日三四易

狼牙湯 療婦人陰蝕其中爛傷濃水淋漓臭穢

用狼牙三兩咬咀以水四升煮取半升去滓內苦酒如雞子中黃大沸湯一盃消盡夜適寒溫以綿纏筋頭大如蠶濡湯以瀝瘡中日四五度即差一方以水

煮洗之一方蝕於肛者單燒雄黃末熏煎苦參湯洗亦可

治女子陰瘡

用硫黃末傅之瘡上即瘥

治婦人陰中生痔凡九竅有肉突出者皆名痔

用烏頭七個燒存性用小瓦罐盛釀醋淬乘熱熏候通手沃之良

洗方 治茄子疾

用茄皮白礬馬稻頭根朴硝澤蘭煮水熏洗加入砂
石灰少許妙

傳藥 治痂子疾

用朴硝為末黃荊柴燒漚調傳或濃鐵漿水敷之

又方 治痂子疾

用硫黃一兩大黑魚一個去頭皮納入藥故紙裹黃
泥固濟火煨烟盡為末米糊丸梧桐子大每二十九
溫酒下如下疽生蟲所下如柿汁臭穢心中疔痛悶

絕虛煩甚者不可治

治茄子疾心躁連綿黃水易治白水難愈

出危氏方

用生枳殼為散熏洗却用絹帛包枳殼滓納入陰中

即日漸消

治婦人產時患瘡

用冬葵子患瘡者吞一粒便治一頭可煮頓服

童女交接陽道違理及為他物所傷犯血出淋漓不止

用釜底墨研胡麻以塗之一方有葫蘆塗藥入陰中

納之

又方

用燒青布并髮為粉傅之大良

治玉門寬冷方

以硫黃末煎湯洗

治陰冷子門癢閉

五倍子

四兩

為細末每用以口中玉泉和如兔屎大內陰門中熱

即効

治女人交接輒血出方

桂心

伏龍肝

各二分

右為末酒服方寸匕瘥止

又方 兼治合陰陽輒痛不可忍

出大全良方

黃連

六分

牛膝

甘草

各四分

右三味細切以水四升煮取二升洗之日三四度瘥

止

治女童交接陽道違理血出不止

出大
良方全

割雞冠血塗之

治陰冷病

出本
草

用丁香為末縫紗囊如小指實末內陰中其病便已

治婦人產門痒痛

以槐皮煎湯浸洗

治婦人陰瘡

出本
草

以瞿麥搗傳之

治婦人陰瘡浮泡

用落鴈木以椿桐煮洗妙

治女人痂病

出如宜方

白獨活 荊芥 甘草

右松花煎湯服仍宜硝菊花煎湯熏洗

治產後陰下脫方

用鼈頭五枚燒末以井花水服方寸日三

治婦人陰瘡

以雞子和光粉炒乾服

治一切婦人因產用力過多陰門挺露不收

出護命方

萆薢

狗脊

去毛

石斛

牛膝

續斷

益智仁

去皮

各半

當歸

一兩

蒼朮

一分

巴戟

去心

附子

火炮

磁石

真上等吸

鐵者燒赤醋淬七度研如塵水飛過用各一兩半

右件藥先熬搗衆藥為細末方入磁末相滾令勻以

薄醋煮稀麴汁丸如梧桐子大早朝熱湯下四十丸

治婦人宮臟虛冷正氣微弱每懷孕時即陰門挺露喫

食減少肌體羸瘦宜喫此方

楊子建萬金護命方

萆薢 五味子 當歸 續斷 石斛 杜仲

人參 細辛 白朮 炙艾葉 川芎

各等分

右細杵羅為末煉蜜丸如梧桐子大空心鹽湯下五十丸吃了若大腑踈轉連連進服以安効為期

治婦人懷孕臨產陰門挺出通而生露

桑寄生 川芎 當歸 黃橘皮 細辛 藿香

人參 防風 炙艾葉

右為細末每服二錢水一盞煎取八分空心去滓喫

治女人陰腫

出本草

用荏子葉生搗和醋以綿裹內三四易

寸金散

出衛生寶鑑方

治婦人子腸不收

蛇床子

韶腦

葫蘆巴

紫稍花

右件各等分為細末每服五七錢用水半碗淋洗之

伊祁散

出衛生寶鑑方

治婦人子腸不收

全蛇

不拘多少

右為細末口噙水鼻內搐之立効

若有息肉突出

出肘後方

以苦酒三升漬烏喙五枚三日以洗之日夜三四度

治陰下濕癢

出肘後方

用吳茱萸一升水三升煮三沸去滓洗癢瘡

治產後傷水陰腫如斗神驗

出胎產救急方

用牡蠣粉傅之

又方

以通脫木根研汁調服

又方

防風 荊芥 蛇床子

右煎湯熏洗

凡產後歸房早多有此陰瘡

出胎產救急方

蛇床子 地骨皮

右煎湯熏洗

又方

黃連 黃芩 枯礬

右煎湯熏洗

治陰瘡癢

出胎產
救急方

枯礬 川芎 硃砂

右為細末綿裏內陰中有蟲即死

又方

枯礬 蛇床子

右為末同煎洗一方則用蛇床

又方

菊花 榴根皮

右煎湯熏洗

又方

蛇床子 白礬 榴根

右五倍煎湯熏洗

治女子陰隱瘡及骨節中寒熱者

出本草

以龜殼作湯浴漬之

治陰癢痛


用車前子以水三升煮三沸去滓洗癢痛處

不用藥法療頰必瘥方

出肘後方

令病人自把糯米餅子一枚并皂莢刺一百箇就百姓間坐社處先將皂莢刺分合社人社官三老以下各付一針即出餅子示人從頭至尾皆言從社官已下乞針搔社人問云搔何物病人云搔人鬼周匝總遍訖針并插盡即時餅却到家收掌於一處餅乾頰

不覺自然永散瘥極神効



普濟方卷三百二十六

欽定四庫全書

子部

普濟方卷三百二十七

詳校官太醫院恩糧臣孔毓秀

編修臣倉聖脈覆勘

總校官進士臣楊懋珩

校對官中書臣吳甸華

謄錄監生臣沈浩

欽定四庫全書

普濟方卷三百二十七 明 周王朱楠 撰

婦人諸疾門

雜病

附論

夫三十六疾者十二癥九痛七害五傷三瘕不通是也
何謂十二癥是所下之物一曰收如膏二曰如黑血三
曰如紫汁四曰如赤肉五曰如濃茄六曰如豆汁七曰
如葵羹八曰如凝血九曰如青如血似水十曰如米汁

十一曰如月浣乍前乍却十二曰經度不應期也何謂
九痛一曰陰中痛傷二曰陰中淋瀝痛三曰小便即痛
四曰寒冷痛五曰經來即腹中痛六曰氣滿痛七曰汁
陰中如有蟲嚙痛八曰脇下分痛九曰腰胯痛何謂七
害一曰竅孔痛不利二曰中寒熱痛三曰小腹急堅痛
四曰臟不仁五曰子門不端引背痛六曰月浣乍多乍
少七曰害吐何謂五傷一曰兩脇滿痛二曰心痛引脇
三曰氣結不通四曰邪思洩利五曰前後痼寒何謂三

痼一曰羸瘦不生肌膚二曰絕產乳三曰經水閉塞病
有異同具治之方 儒門事親書云一富家婦人傷思
慮過甚二年不寐無藥可療其夫求戴人治之戴人曰
兩手脈俱緩此脾受之也脾主思故也乃與其夫以怒
激之多取其財飲酒數日不處一法而去其人大怒汗
出是夜困眠如此者八九日不寤自是而食進脈得其
平矣又云項開令之妻病怒不欲食常好叫呼怒罵欲
殺左右惡言不輟衆醫皆處藥幾半載尚爾其夫命戴

人視之戴人曰此難以藥治乃使二娼各塗丹粉作伶人狀其婦大笑次日又令作角觥又大笑其旁常以兩個能食之婦誇其食美其婦亦索其食而為一嘗之不數日怒減食增不藥而瘥後得一子夫醫貴有才何足應變無窮又云李仲安宅四婦人病同日下涌劑置燠室中火兩盆其一婦發昏衆人皆驚戴人笑曰內火見外火故然昇之門外使飲冰雪水立醒時正雪晴戴人曰熱見寒則醒衆由是皆服非老手諳練必不能鎮衆

庸人之驚也

方

熟乾地黄丸

出簡易湯

治婦人風虛勞冷一切諸疾或風寒

邪氣留滯經絡氣血冷澀不能溫潤肌膚或風寒客於腹內則脾胃冷弱不能尅消水穀或腸虛受冷大便秘時泄或子臟挾寒久不成胎月水不調乍多乍少或月前月後淋瀝不止或閉斷不通結聚癥瘕面色肌體減瘦飲食進退百節酸疼時發寒熱漸至羸損

帶漏五色陰中冷痛時發腫癢月水將行臍腹先痛
皮膚皺澁癰疹瘙癢麻痺筋攣面生黧髮黃脫落
目淚自出心忪目眩及產後勞損未復肌瘦寒熱顏
色枯黑飲食無味漸成蓐勞皆療之

熟乾地黄

二兩酒蒸晒過百遍者

防風

去蘆

肉蓯蓉

酒浸一宿

白茯苓

苓

去皮

禹餘糧

火燒紅醋淬七遍細研

五味子

揀淨

栢子仁

微炒別研

芍藥

各一兩半

澤蘭

去梗二兩一分

厚朴

去粗皮薑汁炒

白芷

乾薑

炮

山藥

細辛

去苗

卷栢

去根各一兩

當歸

去蘆酒浸炒

藁本

去蘆 甘草 炙各一兩六分 人參 蜀椒 去目及閉口者微炒出汗 牛膝

去苗酒 蛇床子 揀淨微炒 續斷 蕪荑 炒 杜仲 去粗皮炙黃各

浸一宿 赤石脂 煨醋 石膏 煨研飛 艾葉 三分 石斛 去根 肉桂

去粗皮 白朮 各一兩一分 紫石英 煨醋淬研飛三兩

右搗羅為末煉蜜和搗五七百杵丸如梧子大每服三十丸溫酒或米飲下空心食前服常服養血補氣和順營衛充實肌膚調勻月水長駐顏除風去冷令人有子溫平不熱無毒妊娠不宜服一方名大澤蘭

九治婦人虛損及中風除病疝瘕除中冷痛頭風入
腦寒痺筋攣緩急血閉無子面上遊風去來目淚多
出涕唾忽如醉或急邪冷逆胸中嘔不及泄痢淋瀝
或五臟六腑寒熱不調心下痞急邪氣欬逆或漏下
赤白陰中腫痛胸脇肢滿或身體皮膚中澁如麻豆
苦癢痰癖結氣或四肢拘攣風行周身骨節疼痛目
眩無所見或上氣惡氣寒洒淅如瘧或喉鼻鼈風癰
癰疾或月水不通魂魄不寧飲食無味并產後內血無所

不治服之令人有子久赤白痢去訖地黄石膏麥門
冬栢子仁加大麥蘗神麴龍骨阿膠黃連各一兩半
有鍾乳加三兩良

濟陰丹

三稜

二兩

莪朮

一片

兩切

蒼朮

油浸

枳殼

去穰

大艾

去根

劉

寄奴

香附子

淨

敗薑

各一兩

烏頭

三合

頭

以上九味

用米醋三升煮

乾取

出焙

當歸

一兩

蒲黃

一兩

紙焙

生地黄

酒浸

熟地

黃

酒蒸

橘皮

去白

細紅者佳

白芍藥

各一兩

玄胡索

炒

五

靈脂酒煮白朮

煨各半兩

牡丹皮

淨去骨

肉桂

去粗皮

赤芍藥

片子薑黃

青皮

去白各一兩

川芎

七錢半

右為末糯米粉穀醋打糊為丸沈香湯下蘇湯鹽湯

亦可

大聖散

出和劑

治婦人血海虛冷久無子息及產後敗血

衝心中風口噤子死腹中擘開口灌藥須臾生下便

得無恙治墮胎中攻刺疼痛橫生逆產胞衣不下血癖

血滯血崩血入四肢應血臟有患及諸腫風氣或傷

寒吐逆欬嗽寒熱往來遍身生瘡頭痛惡心經脈不
調赤白帶下乳生惡氣胎臟虛冷數曾墮胎崩中不
定因此成疾室女經脈不通並宜服之常服煖子宮
和血氣悅顏色退風冷消除萬病兼療丈夫五勞七
傷虛損等病

澤蘭葉

石膏

研各兩

卷栢

去根

白茯苓

去皮

防風

去蘆

厚

朴

去粗皮黃汁炙

細辛

去苗

栢子仁

微炒

吳茱萸

湯浸七次焙乾炒

桔

梗

各一兩

五味子

揀淨

人參

藁本

去苗

乾薑

炮

白芷

川椒

去目閉口者
微炒出汗

白朮

黃耆

去苗

川烏

炮去皮臍

丹參

各三兩

蕪荑

微炒赤

甘草

炙

川芎

芍藥

當歸

各一兩三

分白薇

阿膠

碎炒燥各半兩

肉桂

一兩一分

生乾地黃

一兩半

右為細末每服二錢空心臨卧熱酒調下苦急疾有患不拘時日三服効

金釵煎

出大全良方

專治婦人諸疾產前後風虛痼冷手足

瘰癧豆淋酒化下血風頭痛產後中風荊芥酒化下產後痰涎咳嗽桑白皮湯化下經脈不調或前或後

或多或少血氣攻刺腰脇重痛溫酒化下經脉不通產後血喘蘇木人參煎湯化下血崩不止赤白帶下側柏燒灰調酒下妊娠將理失宜或因驚動痛極妨悶漏胎下血膠艾煎湯化下臨產艱難乳香研酒化下子死腹中胎衣不下用朴硝三錢重研細童便和酒化下產後勞倦傷敗氣血如瘧寒熱遍身疼痛咳嗽溢汗地黃烏梅煎湯化下產後敗血浮腫薑汁少許和酒半盞化下產前服之則安胎臨產亦易產

產後則逐去惡血不生諸疾用童便和酒調下常服
活血駐顏大煖血海升降陰陽滋養營衛或子宮久
冷多病少子急令服之奇効立致忌生冷油膩魚腥
猪母白猪一切毒物

當歸 白芍藥 川芎 石斛酒炒 香附子炒 糯米

各二兩 降真香細剉 熟地黄各四兩 秦艽 貝母去心 羌活

桂心 粉草 乾薑炮 北細辛 牡丹皮 大

豆卷炮 茴香炒 枳殼去穢炒 延胡索 白芷各一兩 人

參木香

石膏

煨

沈香

黃芩

各半兩

川椒

三分

加修製八兩交加即用生地黄四兩絞汁留滓以生薑四兩取汁留滓用生地黄汁拌生薑滓乾

生炒乾生薑汁拌生地黄滓炒乾為末用

右為細末煉蜜為丸每兩作七丸依前服餌常服溫

酒化下

荊芥散

治血風諸般疾產後並宜服諸疾除去

荊芥

雀腦芎

各三兩

當歸

人參

各半兩

桂心

牡

丹皮

羌活

防風

桔梗

大腹皮

甘草

蒲黃 白茯苓 枳殼 厚朴 半夏 杏仁

款冬花 各三分 附子 炮 乾地黄 鱉甲 白芍藥

北柴胡 黃芪 各一兩 乾薑 木香 各半分 沉香 一分

右為細末每服二錢薑三片棗一箇水一盞煎至七

分溫服

南嶽魏夫人濟陰丹

出三方

治婦人血氣久冷無子及數

經墮胎皆因衝任之脈虛損胞內宿挾疾病經水不時暴下不止月內再行或前或後或崩中漏下三十

六疾積聚癥瘕臍下冷痛小便白濁以上疾證皆令
孕育不成以致絕嗣此藥治產後百病若能常服除
宿血生新血令人有孕亦生子充實亦治男子亡血
諸疾

桃仁

去皮尖
仁麩炒

木香

炮

茯苓

京墨

燒各
一兩

蠶布

燒

藁本

秦艽

甘草

人參

桔梗

炒

石斛

酒浸
各二

兩

當歸

桂心

乾薑

細辛

牡丹皮

去心

川芎

各半

川椒

去目閉口
炒出汗

山藥

各三
兩

澤蘭葉

熟地黃

洗酒
蒸焙

香附子

炒各
四兩

蒼朮

米泔浸
去皮

大豆卷

炒各
半升

糯米

升炒一

右為細末煉蜜丸每兩作六丸每服一丸細嚼溫酒
送下淡醋湯調亦可空心食前服一本山藥川椒各
三兩

妙應丹

一名延齡丹
出三因方

治婦人衆病無所不治

晚蠶沙

炒

鯉魚鱗

燒為末

當歸

去蘆

石膏

煨研

澤蘭

去根

附

子炮去

皮臍

木香

炮各
二兩

熟乾地黃

洗酒浸
蒸焙

川芎

防風

防風

去蘆蕪荑炒馬牙硝炒人參黃耆川椒微炒栢子

仁

微炒研

蟬蛻

去足洗焙

白薇

檳榔

不見火各一兩

厚朴

去粗皮薑

製

藁本

去苗

白薑

甘草

炙赤各三兩

紅花

吳茱萸

湯浸

各半
兩

右為末煉蜜搜和杵數千下丸如彈子大每服一丸
血瘕塊病綿灰酒下 催生溫酒嚼細下 血勞血

虛桔梗酒下 血崩棕櫚灰酒下 血氣痛炒白薑

酒下 血風荊芥酒下 血暈悶絕胎死腹中胞衣

不下並用生地黄汁童便酒各一盞煎二服下常
腹痛醋湯溫酒化下並空心食服

地黄粥方 治婦人血氣不調

生地黄

二合汁

粟米

一合粳米一合

鹽花

少許訶梨勒

炮去核為

末半兩

右以水三升先煮二米將熟次入訶梨勒末地黄汁
鹽花攪勻煮令稀稠得所分二服

赴痛丸

出豈明論方

治一切走注疼痛婦人經脈住滯水腫

腹脹

甘遂

大戟

芫花

黃牽牛

各等分

右為末以蕎麥同末和作餅子切為棊子煮熟服之
得利為度每服一錢加減相虛實

烏雞煎丸

一名大烏雞丸出和劑方

治婦人胎前產後諸般疾患並

皆治之

烏雄雞

一箇

烏藥

石床

牡丹皮

人參

去蘆

白朮

黃耆

各一兩

蒼朮

米泔浸切焙一兩半

海桐皮

二兩

肉桂

去粗皮

附

子炮去
皮臍

白芍藥

蓬莪朮

川烏

炮熟乾地黃洗
焙

肉豆蔻

草薺

各半
兩

紅花

陳皮

各二
兩

延胡索

木香

琥珀

右細剉用烏雄雞一隻湯搗去毛及腸肚將上件藥
安放雞肚中用新瓷餅好酒一斗同煮令乾去雞骨
以油單盛焙乾為末煉蜜為丸如梧桐子大每服三
十丸胎前產後傷寒蜜糖酒下 胎前氣悶壯熱炒
薑酒下 白帶赤帶下生薑地黃酒下 產後敗血

注心童子小便炒薑酒吞下 產後血塊瘕築心腹

疼痛玄胡索酒下 胎前嘔逆薑湯下 催生炒蜀

葵子酒下 安胎鹽酒下 室女經脈當通不通四

肢疼痛煎紅花酒下 血氣攻刺心腹疼痛煎當歸

酒下 血暈棕櫚燒灰酒調吞下 血邪研硃砂麝

香酒下 血悶煎烏梅湯研硃砂下 子宮久冷溫

酒或棗湯下空腹日一服 血風勞人參酒吞下

小腹疼痛炒茴香鹽酒吞下 血散四肢遍身虛浮

黃腫赤小豆酒下 常服溫酒醋湯任下空心食前

服

白堊 龍骨 芍藥 黃連 當歸 茯苓

各十銖

黃芩 瞿麥 白蔞 石韋 甘草 牡蠣 細

辛 附子 禹餘糧 藁本 白石脂 人參

烏賊骨 甘皮 大黃

已上各半兩

右為末蜜和丸如梧子大空腹飲服十九日再不知加至二十日至一月百病除若十二癥倍牡蠣禹餘

糧烏賊骨白石脂龍骨若凡痛倍黃連白斂甘草當
歸若七害倍細辛藁本甘皮加川椒茱萸各一兩若
五傷倍大黃石韋瞿麥若三瘕倍人參加赤石脂礬
石巴戟天各半兩合藥時隨病增減之

小白薇丸

出和劑方

治女人衝任虛損子臟受寒久無子息

及斷續不產此因上熱下冷百病滋生或月水崩下
帶漏五色腰腹疼重面黃肌瘦或因產乳不能將護
露廁太早或久坐濕地或冷風從下入血臟既虛或

邪內乘或月水當行失於調攝傷動胞絡陰陽不和
上焦虛陽壅燥下臟邪冷結伏致使胎孕不成冷極
傷敗月水不勻飲食減少夜多盜汗面黧黯齒搖髮
落脚膝疼痛舉動少力並宜服之

覆盆子

去根

菖蒲

微炒各三分

白龍骨

熟地黄

川椒

去目及閉口者微炒去汗各一兩

白薇

去苗一兩

蛇床子

炒

乾薑

炮細

辛

去苗

當歸

去蘆炒

車前子

芎藭

各半兩

遠志

去心桃仁

去皮尖炒黃

白茯苓

去皮

藁本

去苗

人參

卷栢

去根

白芷

肉桂

去粗皮
各三分

麥門冬

去心焙
一兩半

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九溫酒
或米飲下空心食前常服壯筋骨益氣煖下臟除風
冷令有子

白堊丹

出和
劑方

治婦人三十六病崩中漏下身瘦手足熱

惡風怯寒咳逆煩滿抑急短氣心脇腰腹重墜與子
臟相引痛漏下五色心常恐懼遇恚怒憂勞即發皆
是內傷所致並皆治之

牡蠣

煨研

白堊

細辛

去苗

禹餘糧

煨醋

研

烏賊魚骨

燒灰

白石脂

煨

龍骨

煨研

各一兩半

瞿麥穗

附子

炮去

皮臍

芍

藥

石韋

白歛

黃連

去毛

茯苓

去皮

肉桂

去皮

白芷

常歸

去苗

乾薑

炮

人參

甘草

炙各一兩半

川椒

去目

及閉

口者炒出汗半兩

右為末煉蜜丸如梧子大每服三十丸至五十丸空

心溫酒下又一方無人參

琥珀澤蘭煎

一名調經

琥珀

丸出和劑方

治婦人三十八種血氣八

風五痺七疰八瘕心腹刺痛中風癱瘓手足痠疼乳
中結瘀妊娠胎動死胎下出產衣不下敗血湊心頭
旋眼花血症四肢渾身浮腫衝任久疼絕產無嗣早
晚服食能令有子經脈不調赤白帶下惡心嘔逆身
體瘦倦懷胎八月一日一服胎滑易產

紫巴戟

去心糯
米炒

茴香

牡丹皮

去心

劉寄奴草

去根

味子

去梗

白芷

五加皮

去心

金釵石斛

去根剉
酒浸炒

川當

歸

酒浸
一宿

川芎

赤芍藥

澤蘭葉

去根

人參

去蘆

白芍

藥

附子

炮去皮臍

生乾地黄

法去蘆

艾葉

酒炒糯米糊調成餅焙乾

為末熟乾地黄

法去土

白朮

各一兩

右為細末煉蜜丸如彈子大每服一丸溫酒磨下漏胎刺痛煮糯米飲下寒熱往來四肢煩疼煎青蒿酒下婦人室女經血不通煎紅花酒下血暈不省人事童子便和煖酒下催生雞子清和酒下血氣血塊攻刺心腹燒秤錘淬酒下傷寒及中風口禁煎麻黃湯下用被蓋出汗即愈心驚悸及頭疼薄荷酒下咳嗽

桑白皮湯下血風攻症渾身癢癢頭面麻痺炒黑豆
浸酒下產前產後常服不生諸疾甚有神効

烏金散

出宣
明論

治婦人諸疾寒熱頭痛一切等疾

烏金子 肉桂 蒲黃 當歸 蜜蟲 血餘灰

水蛭 鯉魚灰 木香 青皮 皂角 大者炙
各半兩 芍

藥 半兩 芫花 醋炒
三兩 巴豆 一錢
出油 硃砂 少許 欖皮灰 紅花

各一兩 川烏頭 半兩

右為末每服半錢加至一錢煎生薑湯下空心食前

忌油膩等物

加味五積散

出危氏方

厚朴

去粗皮薑汁炒

半夏

洗

楊芍藥

枳殼

去穢炒

木香

肉桂

各一兩

陳皮

白薑

各一兩三錢

蒼朮

六兩米泔浸炒

桔梗

香附子

炒去毛

茴香

炒

粉草

人參

茯苓

去皮

川芎

當歸

去尾

川白芷

各一兩

右剉散生薑木瓜入鹽煎服陰證傷寒生薑附子血脈不勻紫蘇氣嗽烏梅薑錢勻經棗子薑補益血海

蘇鹽產後生薑醋炒陳艾胃冷不納食陳皮縮砂赤
白帶陳米冷氣疾木香茱萸心燥背筋急頭暈腰脚
痠生乾地黃當歸痺虛蘇葉粉草月中被驚或因淨
觸心頭結塊五隔五噎茴香棗子口苦舌乾吞酸噫
氣此為胃冷生薑鹽腰痛桃仁木瓜杜仲川續斷身
痛秦艽諸虛脾胃不和羸瘦冷氣蘇鹽冷瀉炒過生
薑烏梅肉豆蔻陳米

萬病紫苑丸

出拔
萃方

療臍腹久患痼癖如碗大及諸黃每

地氣起時上氣衝心遶臍絞痛一地蟲咬十種水病
十種蟲病反胃吐食嘔逆惡心飲食不消天行時病
婦人多年月露不通或腹如懷孕多血天陰即發又
治十二種風頑痺不知年歲晝夜不安夢與鬼交頭
白多屑或哭或笑如鬼魅所著腹中生瘡腹痛服之
皆効

紫苑

去苗土

吳茱萸

湯浸七次焙乾

菖蒲

柴胡

去鬚

厚朴

薑製

一桔梗

去蘆

茯苓

去皮

皂角

去皮子等炙

桂枝

乾薑

炮

黃

連

去鬚
八分

蜀椒

去目閉口者
炒出汗用

巴豆

去膜出
油研

人參

去蘆
各半

兩

川烏

炮去皮半
兩加二錢

羌活

獨活

防風

各加
等分

右為細末入勻巴豆煉蜜丸如梧子大每服三丸漸
加至五七丸生薑湯送下食後臨卧服初有孕者不
宜服具引于後痔漏腸風用酒下赤白痢訶子湯下
濃血痢米飲湯下墮傷血悶四肢不收酒下蛔蟲咬
心檳榔湯下氣噎憂噎荷葉湯下打撲傷損酒下中
毒箒灰甘草湯下一切風升麻湯下寸白蟲檳榔湯

下霍亂乾薑湯下咳嗽杏仁湯下腰腎痛豆淋湯下
陰毒傷寒溫酒下吐逆生薑湯下食飲氣塊麵湯下
時氣井花水下脾風陳皮湯下頭痛水下心痛溫酒
下大小便不通燈心湯下因物所傷以本物湯下吐水
藜蘆湯下氣病用乾薑湯下小兒天風弔搐防風湯
下防己亦可小兒疳利葱白湯下小兒乳食傷白湯
下月信不通煎紅花酒下婦人腹痛川芎湯下懷孕
半年後胎漏艾湯下有子氣衝心酒下產暈痛溫酒

下血氣痛當歸酒下產後心腹脹滿豆淋湯下難產
益智湯下產後血痢當歸湯下赤白帶下酒煎艾湯
下解內外傷寒粥飲下室女血氣不通酒下子死菜
子湯下又治小兒驚癇大人顛狂一切風及無孕婦
人身上頑麻壯如蟲行四肢俱腫呻吟等疾

沈香煎丸

丁香一兩南木香半兩訶子肉 肉豆蔻 陳皮 甘

草 人參去蘆 胡椒 青皮 生薑屑各半兩 白豆蔻

縮砂仁

檳榔

乾薑

官桂

各五錢
半去皮

沈香

二錢
半

麝香

二兩

白朮

四錢

右為細末煉蜜為丸如棗子大每服一丸細嚼生薑湯下溫紅酒亦可空心食前日進三服

內炙散

出和劑方

治婦人胎前產後一切血疾血崩虛憊腹

脇病痛氣逆嘔吐冷血冷氣凝積塊硬刺痛泄下青白五色腹中虛鳴氣滿堅脹瀝血腰疼口吐清水頻產血衰顏色青黃勞傷劣弱月經不調下血墮胎血

迷血暈血瘕時發疼痛頭目眩暈惡血上心悶絕昏
迷惡露不乾體虛多汗手足遂冷並宜服之

茴香

揀淨炒

藿香

丁香皮

熟乾地黄

洗焙

肉桂

去粗

皮各一兩半

山藥

當歸

去蘆洗

白朮

白芷

各八兩

藁本

去蘆

乾薑

炮

川芎

黃耆

去苗各一兩

木香

一兩

陳皮

去白四兩

白芍藥

十兩

甘草

炙赤八兩

右為細末每服三錢水一盞生薑錢五片艾一團同
煎至七分空心食前熱服溫酒調下亦得如產後下

血度多加蒲黃煎服惡露不快加當歸紅花煎服水
瀉加肉豆寇末煎服嘔吐加藿香生薑煎服上熱下
冷加荊芥煎但是腹中虛冷血氣不和並宜服產後
每日一服則百病不生丈夫虛冷氣刺心腹疼痛尤
宜服之

龍鬚湯 治胎前產後身疼保室論云身疼者肌體不
實而受風邪客於經絡邪氣與正氣相搏交擊於骨
之間故身疾而不動用龍鬚湯主之若妊娠而患身

體疼者必因勞役過多致使然也不爾經絡受風寒
愈痛丸防風湯主之產者必因勞後身疼而不能動
轉者良由產後百節開張血脉流走氣弱則骨肉之
間血多凝滯是故百節經脈緊急腰背不能轉側手
足不能動搖身熱若納炭頭如釘錠醫者不識妄為
傷寒發汗變生他證宜服

牛膝

洗去蘆酒浸一宿急用酒蒸熟為度

當歸

酒浸去蘆

白朮

防風

去蘆

獨活

去蘆

甘草

各二兩半

黃耆

一兩半

右吹咀每服半兩井水五盞生薑十片薤白一握同煎至三盞去滓不拘時服

交感地黃煎丸

出三因方

治婦人產前產後眼見黑花或即

發狂如見鬼狀胞衣不下失音不語心腹脹滿水穀不化口乾煩渴寒熱往來口内生瘡咽中腫痛心忪悸夜不得眠產後中風角弓反張面赤牙關緊急崩中下血如豚肝狀臍腹痛血少結為癥瘕恍惚昏迷四肢腫滿產前胎不安產後血刺痛並皆治之

生地黄

淨洗研以布製汁留滓以生薑汁炒地黄滓以地黃汁炒生薑滓至乾甚為末為度

生薑

淨洗爛研以布製取自然汁留滓各二斤

延胡索

拌糯米炒赤去皮

當歸

去琥珀

別研各一兩

蒲黃

炒香四兩

右為末蜜丸彈子大當歸湯化下一丸食前服

勝金丸

一名勝金丹出大全良方

治婦人久虛無子產前產後一切

病患兼療男子下虛無力此藥能安胎催生妊娠臨

月服五七丸產時減痛婦人無孕子宮冷如服二十

丸可望孕育又治積年血風脚手麻痺半身不遂赤

白帶血如山崩及治產後腹中結痛吐逆心痛子死
腹中遶臍痛氣滿煩悶失蓋汗不出月水不通四肢
浮腫無力血勞虛勞小便不禁中風不語口噤產後
痢疾消渴眼前見鬼迷暈敗血上衝寒熱頭痛面色
痿黃淋瀝諸疾血下無度血痢不止飲食無味產後
傷寒虛煩勞悶產後血癖產後羸瘦凡婦人諸虛不
足心腹疼痛一切諸疾不論年深日久並皆治之
一方名不換金丸

白芍藥

藁本

石脂

赤白皆可

川芎

不見火

牡丹皮

當歸

白茯苓

人參

白薇

白芷

桂心

延胡索

白朮

米泔浸一宿各一兩

沒藥

甘草

炙江西安撫司沒藥

甘草減半

右等分為末煉蜜丸如彈子大每服一丸溫酒化下
初產了並用熱醋湯下空心食前此方係王承宣息
祖傳渠家凡婦懷身便服此藥神妙常服尤好像在
京師於能家傳一方有沈香無沒藥一方有附子無

沈香

白朮煎 治胎前產後血氣諸疾

木香

錢五

三稜

莪朮

白朮

各一兩

枳殼

炒

白茯苓

當歸

延胡索

人參

熟地黄

洗

牡丹皮

甘草

各半兩

右為細末米糊丸如梧桐子大每服十五丸至二十丸常服溫酒吞下胎前渾身并手脚痛炒薑酒下胎前腹內痛并安胎紫草煎湯下胎前嘔逆吐食糯

米飲下 胎前飲食不得渾身倦怠豆淋酒下 胎

前渾身發熱甘草湯下 胎前咳嗽煨薑鹽湯下

胎前頭痛煨葱茶下 胎前產後瀉紫蘇薑酒下

催生胎衣不下嚼葱白三寸煖酒下 產後赤白痢

乾薑甘草湯下 產後下血不止燒紗帽灰一錢調

酒下 無燒漆亦可 產後渾身虛腫陳皮去白焙

乾浸酒下 頭疼薄荷茶下 常服飯飲下 赤白

帶下燒椶櫚灰三錢調酒下 久年血氣陳塊築心

痛溫酒下 炒薑酒下及良薑浸酒下皆可婦人室

女經脈不通煎紅花蘇木酒下 經脈不調或前或

後或多或少煎當歸酒下 大便小便秘結燈心湯

下 乳汁不通苦蘆煮猪蹄羹下 產後腰痛煎芍

藥酒下

保生丸 養胎益氣安和子臟治妊娠將理失宜或因

勞役胎動不安腰腹痛重肥阻漏胎惡露時下臟挾

疾久不成胎或受妊不能固養痿燥不長過年不產

日月雖滿轉動無力或致損墮及臨節適乖宜驚動
太早產時未至惡露先下胎胞枯燥致令產難或橫
或逆痛極悶亂連日不產子死腹中手足冰冷口唇
青黑吐出冷沫新產惡血上衝暈悶不省喘促汗出
及瘀血未盡臍腹疼痛寒熱往來或因產勞損虛羸
未復面黃體瘦心忪盜汗飲食不進漸成蓐勞入月
常服壯氣養胎正順產理潤胎易產產後常服滋養
血氣和調陰陽密腠裏實腑臟治風虛除痼冷一名

千金丸

大麻仁

去皮一兩半

貝母

黃芩

大豆黃卷

糯米

一作黍米

甘草

微炒赤細研

乾薑

炮

肉桂

去粗皮

石斛

去根

石膏

細研各一兩

當歸

去蘆炒半兩

秦椒

微炒汗出一兩

右為細末煉蜜和丸如彈子大每服並用溫酒或棗湯化下嚼亦得空心食前服一方用蒲黃一兩

半夏丸 治女人腹中十二疾一曰經水不時二曰經

來如清水三曰經水不通四曰不周時五曰生不乳

六曰絕無子七曰陰陽減少八曰腹苦疼如刺九曰
陰中寒十曰子門相引痛十一曰經來凍如葵汁狀
十二曰腰急痛凡此十二病得之時因與夫卧起月
經不去或卧濕冷地及以冷水洗浴當時取快而後
生百病或瘡痍未瘥便合陰陽及起早作勞衣單席
薄寒從下生

半夏

赤石脂

各一兩
六銖

蜀椒

乾薑

吳茱萸

當歸

桂心

丹參

白欬

防風

各一兩

藿蘆

半兩

右為末蜜和丸如梧桐子大每日空心酒服三十丸
不知稍加以知為度

龍骨散 治腹下十二病絕產一曰白帶二曰赤帶三
曰經水不利四曰陰胎五曰子臟堅六曰臟癖七曰
陰陽患痛八曰內強九曰腹痛十曰臟閉十一曰五
臟酸痛十二曰夢與鬼交宜服之

龍骨_{三兩} 黃蘗_兩 半夏 竈中黃土 桂心 乾薑

各二兩 石韋_兩 滑石_{各一兩} 烏賊骨 代赭_{各四兩} 白殭

蠶五枚

右治下篩酒服方寸七日三白多者加烏賊骨殭蠶各二兩赤多者加代赭五兩小腹冷加黃蘗二兩子臟堅加乾薑桂心各二兩以上各隨病增之服藥三月有子即住藥太過多生兩子當審方取好藥寡婦童女不可妄服

蠶血丸 治婦人血海虛冷百病發生氣血不調時發寒熱或下血過多或久閉不通崩中不止帶下赤白

癥瘕癖塊攻刺疼痛小腹緊滿脇肋脹痛腰重脚弱
面黃體虛飲食減少漸成勞狀及經脈不調胎氣多
損產前產後一切病患無不治療

菊花

去梗

茴香

香附

炒酒浸
一宿

乾地黄

當歸

肉

桂

去粗皮

牛膝

延胡索

炒

芍藥

蒲黃

蓬朮

各三

兩

右為末用烏豆一升醋煮候乾焙為末再入醋二碗
煮至一碗留為糊丸如梧桐子大每服三十九丸溫酒

或醋湯下血氣攻刺炒薑酒下癥瘕疼痛當歸湯下
忌鴨肉羊血此藥煖子宮能令有子又治皴血損調
補衝任溫煖血海及胞傷損宿瘀乾血

人參白朮散

出宣明論

治偏身燥濕相搏玄府緻密煩心忪

悸發渴飲食減少不為肌膚

人參

三錢

白朮

七錢

薄荷

半兩

生地黄

半兩

茯苓

去皮

甘草

各半

兩

硝砂仁

三錢

黃芩

二錢

藿香

三錢

石膏

一兩

右為末每服三錢水一盞煎至六分去滓溫服日二

三服食前下

治婦人諸疾

蒼朮 陳皮 赤芍藥 川芎 白芷 甘草

各二錢

錢 乾薑 乾葛 荊芥 肉桂

各三錢 桂枝

三錢

右為散除感冒寒熱每服頭痛加川芎半夏腹痛加
桃仁腰痛加杜仲寒加桂熱加荊芥月水不止加韭
子白粟米經事不行加生地黃

聚功丸

楊氏家藏方

溫經止痛破塊散寒調血氣進飲食

附子

六錢煮去皮臍

當歸

洗焙

人參

去蘆頭

赤芍藥

半夏

洗湯

七遍木香

青橘皮

白朮

蓬莪茂

炮

厚朴

薑汁梨炒

已上一十味各一兩

乾漆

三分炒令烟出為度

右件為細末生薑汁煮麵糊丸如梧桐子大每服三十丸橘皮湯或米飲送下不拘時候

烏金散

治女人諸疾寒熱頭疼一切等疾

烏金子

肉桂

蒲黃

當歸

蜜蟲

血餘灰

水蛭

鯉魚灰

木香

青皮

皂角

大者炙各半兩

右為末每服半錢加至十分煎生薑湯空心服忌油

膩物

白薇散

出危氏方

隨證酌量用湯引

白薇

去土

川芎

熟地黄

酒炒

桂心

牡丹皮

去骨

甘草

炙

當歸

去尾

澤蘭葉

蒼朮

切焙

芍藥

各等分

右為末每服三錢氣刺心脇痛艾醋澤蘭湯頭痛心燥米泔米飲氣虛土芎湯頭痛荊芥湯胎前潮熱氣急心悶生地黃燈心產後腹膨吐逆藿香胡椒胎氣

不安陳艾下血不止糯米地榆陳艾產後血刺脇痛
艾醋湯小腹痛地黃薑汁好酒產後腰腿疼痛背膊
痛木瓜白膠香沒藥好酒月經不勻百草霜溫酒若
過多藕節酒煎又用陳艾阿膠月水不通杜牛膝野
苧根蘇木紅花酒下赤白帶心燥腰痛沒藥白帶黃
耆切和鹽炒酒浸吃十服胎衣不下順流水酸車草
產後血氣當歸鹽炒好酒產後勞嗽糯米桑白皮熱
嗽生地黃芭蕉水產前產後潮熱桃柳枝臨產小腹

緊痛桑白皮葛根立便催生產前產後臟腑結枳殼
下血地榆心神亂銀器大小便秘麻仁蘇子佳血風
脚膝腫痛寒熱生薑黃水柳根血崩竹青藕節霜梅
吐熱紅山梔子竹青藕節奶癰蔓荊子酒煎調服之

十柔丸

出百一
選方

治補婦人血氣

熟乾地黄

四兩

當歸

茯苓

酒浸無以
鹿茸代之

桂

紫苑

補骨脂

鹿角膠

炒

栢子仁

熟艾

別研酒
浸熬膏

白茯苓

苓

各二
兩

右為細末艾膏為丸如梧桐子大每服七八十九溫

酒或米飲送下

琥珀丸

出和濟方

治婦人或者或少產前產後及百病療三

十六種血冷七疝八瘕心腹刺痛卒中癰瘕半身不遂八風十二痺等手足痠乳中毒結瘀血懷胎驚動傷犯不安死胎不出并衣不下並宜服之

琥珀

研

辰砂

別研

沈香

阿膠

碎炒

肉桂

去粗皮

石斛

去根

附子

炮去皮臍

五味子

揀淨

川芎

各半兩

牛膝

去苗酒浸一宿

當歸

去苗炒

肉蓯蓉

切酒浸一宿焙

人參

續斷

沒藥

研各熟三分

乾地黄

木香

各一兩

右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一錢空心煖酒調下午時食前再服能生精血去惡血若人腹脇疼痛繞臍如刀刺及嘔逆上氣築心痰毒不思飲食用薑汁少許和酒服諸痢及赤白帶下血冷崩中下血漏胎下血用生薑與艾剉炒令赤色入酒同煎數沸去滓調服洩瀉不止陳米飲服溢尿諸淋煎通草燈

心湯服血暈不知人煎當歸酒調服上焦下冷濃煎
人參湯服偏身虛腫水氣煎赤小豆湯服產內二毒
物傷寒及中風角弓反張身如板硬煎麻黃湯服使
被益出汗月經不通或間雜五色頻併而下斷續不
止飲食無味肌膚瘦劣面赤唇焦乍寒乍熱四肢煩
疼五心燥熱黑黧遍身白班赤腫走疰及血風勞傷
無力用童子小便入薑汁少許調服常服以小便為
妙若恐惡心和以半酒如懷胎人於難月一日一服

至產下不覺疼痛或病人服至五服十服日倍飲食是藥功成矣其功不能俱載略述急用湯使于前

交加散 治營衛不和月經湛濁大能滋養血絡逐散

惡血臍腹撮痛腰腿重墜血經諸疾並皆治之

生薑

十二兩研取自然汁

生地黄

一斤研取自然汁

延胡索

醋紙裹煨令熟

用布揉去皮

白芍藥

當歸

桂心

各一兩

紅花

炒無惡血不用

沒藥

別研各半兩

蒲黃

一兩隔紙炒

右先將地黃汁炒生薑生薑汁炒地黃各稍乾焙

為細末入諸藥同研令勻每服三錢溫酒調下如月經不依常蘇木煎酒調下若腰疼用糖毬子煎酒調下無時候

烏啄丸 治腸覃病因寒氣客於腸外與胃氣相搏正氣不榮繫瘕內著惡氣乃起其生也殆如雞卵久久乃成狀如懷胎按之堅推即月事時下故曰腸覃亦治乳餘疾大小便不利并食有伏蟲臚脹癰疽毒腫久寒邪氣

烏啄

炮去皮
尖二錢

半夏

湯洗七
次四錢

石膏

煨

藜蘆

炒

牡蒙

茯苓

酒浸各
一錢

乾薑

炮

桂心

各二錢
三字

巴豆

六七個
研膏

右為末蜜丸如菉豆大每服三五丸食後酒飲任下

亦治男子疝痛

卷栢丸

治婦人衝任本虛血海不足不能流通經絡

月水不調赤白帶下三十六疾並皆治之常服和經

絡煖六臟潤肌膚長髮去黥除風令人有子

卷栢

去根當歸

洗焙乾
各二兩

川芎

熟乾地黄

洗炒

栢子仁

微炒

香栢子

肉蓯蓉

牡丹皮

各一兩

艾葉

炒二兩

右為細末煉蜜丸如桐子大每服五十九丸溫酒米飲任下空心食前服一方有川椒

治血氣不和滋養血氣

青皮

三稜

琥珀

麥蘖

當歸

神麴

赤

茯苓

白芍藥

甘草

各一兩

右為細末每服二錢用棗子湯調下

溫白丸

治婦人諸疾繼續而生帶下淋瀝五邪失心

憂愁思慮意不樂飲食無味月水不調及腹中一切疾病有似懷孕連年累月羸瘦困弊或歌或哭者凡如鬼所使但服此藥無不愈者

吳茱萸

湯洗七次
焙炒半兩

桔梗

柴胡

菖蒲

紫苑

去苗

葉

黃連

去鬚

肉桂

去粗皮

茯苓

人參

去蘆

蜀椒

去目及閉口者

炒出汗

巴豆

去皮心末去油炒細研

皂莢

去皮子各半兩

厚朴

去粗皮薑汁炒

川烏

炮去皮臍各二兩半

右為末入巴豆末和勻煉蜜丸如梧桐子大每服三

九生薑湯下食後臨卧漸加五七丸

莪朮散 隨證加味宜酌量之入藥

當歸

去尾

川芎

莪朮

煨

甘草

楊芍藥

熟地黄

酒蒸

茴香

白芷

右為末每服二錢鹽酒調下月經不調銀器燈心安
胎黃耆生地黃補虛調氣生薑紅棗遍身虛腫常歸
酒小便不通滑石末心虛發狂硃砂研調敗血衝心
腹痛如刀刺燒秤錘紅淬酒不退五靈脂酒血閉身

疼炒薑酒吐酸水丁香七粒煎湯血風上攻眼目浮
腫荊芥小腹痛木瓜渾身浮腫薑湯或葱湯胃惡藿
香頭面腫赤豆荊芥湯下血不止木香湯冷嗽桑白
皮乾柿頭痛川芎細辛血風潮熱生薑紅棗虛汗麻
根嘔吐不止陳青膏血風腰疼芸薹子搥碎女人血
結不通手發攣急不知其數蘼菜一握順流水搾汁
手足痺樟柳根浸酒血海虛冷大艾腹脹不消芝麻
一合炒薑酒月水不勻當歸浸酒女人血氣成塊築

心銀子燈心血崩赤白帶真龍骨末好紅醋調之血
氣風中心狂言亂語渾身壯熱桃柳枝七寸血刺成
塊不散菴間女人癖氣隔氣炒茴香酒婦人不問虛
熱傷風血氣潮熱增寒一切百病先以三服隨証湯
引投之服以他藥調理無不應驗冷嗽猪血心燥猪
肝酒催生順流水滑石禹餘糧榆白皮坯子乳香葵
子酸連草汁煎湯或黃柞葉垂下者胎衣不下再加
莪朮地黃竹青行血菴間生地黃紅花蘇木陳艾減

揚芍藥加赤芍藥稍

木香散

治婦人脾氣血蠱氣蠱

木香

沈香

乳香

研

甘草

川芎

胡椒

陳

皮

人參

晉礬

各半兩

桂心

乾薑

炮

硝砂

各一兩

茴香

炒半兩

天茄

五兩赤小者乾秤

右洗焙為末空心日午溫陳米湯調下二錢忌羊肉

至聖湯

治婦人血氣產前產後百疾

當歸

芍藥

乾薑

莪茂

桂心

地黃

蒲

黃

炒各半兩

黑豆

炒去皮一兩

右為細末空心熱酒下二錢

地黃湯 療女人傷於丈夫四體沈重噓吸頭痛

地黃

生者八兩

芍藥

五兩

香豉

一升

葱白

一斤

生薑

四兩

甘草

炙二兩

右切水七升煮去二升半分三服不得重作慎房事
一方無生薑甘草

小柴胡湯 治男女諸熱出血熱蘊隆

柴胡

二兩

黃芩

人參

甘草

炙各七錢半

半夏

製六錢一字

右水一大碗同煎臨熟入薑汁三大匙食後旋服一方棗二箇烏梅一箇煎服

桑白皮湯 療諸婦傷丈夫若頭痛欲嘔悶

桑根白皮

半兩

乾薑

二錢

桂心

五寸

大棗

二十枚

右切以水一斗煮三四沸去滓分溫服之適衣無令汗出

抽刀散 治婦人血風血氣等疾

五靈脂

炒

莪茂

桂心

芸薹子

炒各半兩

右為末每服二大錢酒半盞煎至八分疾作熱服

琥珀散

治產前產後血氣不和及一切疾

當歸

微炒

川芎

各一兩

赤芍藥

二兩

莪茂

一兩煨

右為末每服二錢空心溫酒調下如腰腹痛加陳皮去白半兩乾薑炮半兩為末同和停如不飲水一盞煎七分服

四物湯 益營衛滋氣血治月水不調臍腹痛婦人

經病或前或後或多或少或疼痛不一腰足腹中痛或崩中漏下或生產惡露過多或停留不出妊娠腹痛下血胎不安產後血塊不散或去血過多惡露不止四物湯加茱萸煎服若陽臟少使茱萸若陰臟多使茱萸一方加香附子諸虛不足並皆治之

熟地黃

補血如臍痛非此不能
除乃通於腎經之藥也

川芎

治風泄肝木
也如血虛頭

痛非芎不能除乃
通肝經之藥也

芍藥

和血理脾如腹中虛痛非
此不能除乃通脾經之藥

也
當歸

和血如血刺痛非此不
能除乃通肝經之藥也

右為粗末水煎加減於後治婦人骨蒸加地骨皮牡
丹皮若妊娠胎動不安下血不止者加艾十葉阿膠
一斤又加葱白黃耆若血臟虛冷崩中去血過多亦
加膠艾若婦人常服春倍川芎脈弦頭痛夏倍芍藥
脈洪飡泄秋倍地黃脈沈瀉虛血冬倍當歸脈沈寒
而不食若春則防風四物湯加防風倍川芎若夏則
黃芩四物加黃芩倍芍藥若秋則門冬四物加天門
冬倍地黃若冬則桂枝四物加桂枝倍當歸若血虛

而腹痛微汗而惡風四物加茂桂謂之腹痛六合若
風眩暈加秦艽羌活謂之風六合若氣虛弱起則無
力睚然而倒加厚朴陳皮謂之氣六合若發熱而煩
不能睡卧者加黃連梔子謂之熱六合若虛寒脈微
自汗氣難布息清便自便加乾薑附子謂之寒六合
若中濕身沈重無力身涼微汗加白朮茯苓謂之濕
六合

若產後虛勞日久而脈浮疾宜柴胡四物湯

川芎 熟地黃 當歸 芍藥 各一兩半 加柴胡八錢

參 黃芩 甘草 半夏 麴 各二錢

同煎用溫酒半盞和勻煎藥服

若婦人筋骨肢節痛及頭痛脈眩增寒如瘧宜治風
六合或傷損氣血乘虛而暈

四物湯 防風 羌活 各一兩

若氣血上衝心腹肋下滿悶宜治氣六合

四物湯 木香 檳榔 各一兩

若腹下虛冷腹痛及腰脊間悶痛宜玄胡六合小腹痛者同用

四物湯

四兩

玄胡

苦練

各一兩
碎炒焦

若氣冲經脉故月事頻併臍下多痛宜芍藥六合

四物湯

四兩

芍藥

一兩

若經事欲行臍腹絞痛臨經痛者血澁也宜入四物湯

四物湯

四兩

玄胡

苦練

碎炒焦

檳榔

木香

各一兩

若經水過多別無餘証宜黃芩六合

四物湯

四兩

黃芩

白朮

各一兩

若經水澁少宜四物湯內加葵花煎又加紅花血見愁

若婦人虛勞氣弱咳嗽喘滿宜厚朴六合

四物湯

四兩

厚朴

一兩

枳實

半兩炒

已上四味治法如左一証於四物湯中各加一味用之如小腹痛四物湯四兩如玄胡苦練各加一兩

若經水暴下加黃芩一兩若腹痛者加黃連如夏不
去黃芩若經水如黑豆汁者加黃芩黃連各一兩若
經少而色和者四物湯外加熟乾地黃當歸各一
兩若經適來適斷或有往來寒熱者先服小柴胡証
表邪猶有不能効也依前論之中變証隨証用藥調
治

若婦人血積者四物湯內加

廣茂 京三稜 桂 乾漆

各一兩

若婦人傷寒汗下後飲食減少血虛者宜入四物湯

四物湯

兩四

黃耆

甘草

茯苓

白朮

兩各一

若妊娠傷寒中風表虛自汗頭痛項強身熱惡寒脈浮而弱太陽經病宜表虛六合湯

四物湯

兩四

桂枝

地骨皮

錢各七

若妊娠傷寒頭痛身熱無汗脈浮緊太陽經病宜表

實六合

四物湯

兩四

麻黃

細辛

兩各半

若妊娠傷寒中風濕之氣肢節煩疼脈浮而熱頭疼
宜風濕六合湯太陽標病也

四物湯

四兩

防風

蒼朮

製各七錢

若妊娠傷寒下後過經不愈濕毒發斑如錦文宜升

麻六合

四物湯

四兩

升麻

連翹

各七錢

若妊娠傷寒胸脇滿痛而脈弦少陽頭昏項強宜柴

胡六合湯

四物湯

四兩

柴胡

黃芩

各七錢

若妊娠傷寒大便硬小便赤氣滿而脈沉數陽明太陽本病也急下之宜大黃六合湯

四物湯

四兩

大黃

五錢

桃仁

十箇去皮麤炒

若妊娠傷寒汗下後咳嗽不止者宜人參六合湯

四物湯

四兩

人參

五味子

各五錢

若妊娠傷寒汗下腹虛痞脹滿者陽明本虛也宜厚朴六合湯亦治咳嗽脹滿

四物湯 厚朴

枳實 錢炒各五錢

若妊娠傷寒汗下後不得眠者梔子六合湯

四物湯

四兩

梔子

黃芩

若妊娠傷寒身熱大渴蒸蒸而煩脈長大者宜石膏

六合湯

四物湯

四兩

石膏

知母

錢各五

若妊娠傷寒小便不利太陽本病宜茯苓六合湯

四物湯

四兩

茯苓

澤瀉

錢各五

若妊娠傷寒太陽本病小便赤如血狀者宜琥珀六合湯

四物湯

四兩

琥珀

茯苓

各五錢

若妊娠傷寒汗下後血漏不止胎氣損者宜膠艾六合湯

四物湯

四兩

阿膠

艾

各五錢一方加甘草同上
一方加乾薑甘草黃耆

若妊娠傷寒四肢拘急身涼微汗腹中痛脉沉遲少陰病也附子六合湯

四物湯

四兩

附子

炮去皮臍

桂

各五錢

若赤白帶下宜香桂六合湯

四物湯

四兩

桂

香附子

各五錢

若妊娠傷寒蓄血証不宜隨胎藥下之宜四物大黃

湯下

四物湯

四兩

生地黃

大黃

各五錢酒浸

若虛熱病四物與參蘇飲相合名補心湯主之若四肢腫痛不能舉動蒼朮合半夏湯主之若治燥結四

物與調承氣湯合半為玉燭散若流濕潤燥宜四物湯理中合半湯若保胎氣令人有子四物與硝砂四君子湯各半名八珍湯

若熱與血相搏口舌乾渴飲水加 括蕒 麥門冬

若腹中刺痛惡物不止加 當歸 芍藥

若血崩者加 生地黃熟 蒲黃 黃芩一方無

若因熱生風者加 川芎 柴胡 防風一方無

若臟秘澁者加 大黃 桃仁

若嘔者加 白朮 人參 生薑一方無生薑

若滑瀉者加 官桂 附子

若發寒熱者加 乾生薑 牡丹皮 芍藥一方無芍藥

柴胡

若大渴者加 知母 石膏

若水停心下微吐逆者加 猪苓 茯苓 防風

若頭昏項强者加 柴胡 黃芩

若虛寒似傷寒者加 人參 柴胡 防風

若產婦諸證各隨六經以四物與仲景藥各半服之
甚効

若婦人或因傷酒或因產亡血或虛勞五心煩熱者
宜四物二連湯

四物湯

內用生地黃

黃連

胡黃連

真者

用溫飲

四物與桂枝麻黃白虎柴胡理中四逆茱萸承氣涼
膈等皆可作各半湯易老用藥大略也

若虛煩不得睡者加 竹葉 人參

若婦人血氣虛心腹疴痛不可忍者去地黃加乾薑名

四神湯

若諸痛有濕者四物與白朮相半加

天麻 茯苓 川山甲 用酒煎

若目赤暴發作雲翳疼痛不忍宜四物龍膽湯

四物湯

各四兩

羌活

防風

草龍膽

防己

各三錢

用水煎

一方等分為粗末每服四錢水一盞半煎至八分去

滓取六分清者帶熱服食前若平常血氣不調及常服只用本方日二三服治經血凝滯腹內血氣作疼加莪朮官桂等分用之王石膏云熟地黃滯血安能止痛不若用五味子代之如因產後欲推陳致新補血海治諸疾加生薑煎若胎動不安下血每服加艾葉五七片更加蔥白阿膠未減四味之半當歸用小半如疾勢甚者以四味各半兩細剉以水四盞熟艾一塊如雞子大阿膠五七片煎至二盞半去滓分作

四服一日令盡一方有粉草乾薑黃耆日二三服至
二臘以一七日為一臘以前產後每日可一二服亦
治血痢疾不止腹痛難忍宜加阿膠艾葉煎服名六
物湯如氣虛弱血海不調服一月無不効也如產後被
驚氣滯種種積滯敗血一月內惡物微少敗血或病
或脹或疼胸膈脹悶或發寒熱四肢疼痛加延胡索
沒藥香白芷與四物等分為細末淡醋湯或童子小
便酒調下如血風於產後乘虛發作或產後傷風頭

疼發熱百骨節痛加荊芥穗天麻香附子石膏藿香
一分四物料共一兩中加之每服三錢水一盞煎至
七分服如寒熱往來加炮了乾薑牡丹皮各一分若
平常些少虛眩肢體瘦倦月信不調只用生薑薄荷
如常服此是婦人常服之藥蓋謂寡而性緩効遲而
功深治老人風秘加青皮等分煎服一方治婦人腹
痛作聲經脈不快加熟地黄一倍添桂半倍煎治瘡
疾加荊芥酒煎常服一方名五神湯柴胡大能補虛

退熱一方以四物湯共四兩為細末煉蜜為丸如梧
桐子大空心米飲下三四十丸以療年高婦人白帶
又良驗也請詳之四物湯加甘草半兩細末煉蜜為
丸每兩八九丸酒醋共半盞煎湯同化調停下名當
歸煎去敗血生好血如人行五里再進一丸無時候
服一方剉散隨病証加減後藥煎服血氣不調加吳
茱萸一兩甘草半兩補下元加乾薑半兩甘草七分
血崩氣滯腹內刺痛炮附子一個赤石脂一兩便血

及帶下加荊芥地椒血氣滯腹內刺痛加桂產後傷
風頭痛加石膏一兩甘草半兩血風勞加荊芥柴胡
潮熱加前胡子乾葛人參黃芩虛熱口乾加門冬半
兩黃芩一兩嘔吐不止加藿香白朮半兩人參一錢
產後虛憊血熱煩悶加生地黃產後腹脹加枳殼肉
桂各三錢產後惡露腹痛不止加桃仁蘇木牛膝產
後寒熱往來加柴胡門冬各半兩經血淋漓不斷加
乾瑞連房炒入藥血滯不通加紅花桃仁各一分產

後悶亂加茯神遠志半兩虛而多汗加煨牡蠣麻黃
粉各半兩妊娠心腹痛加竹茹一塊如有敗血則用
當歸近上節白芍藥以赤易熟地黄以生者一方剉
散每服四錢水一盞半煎至七分去滓食前熱服或
為末服亦可若常服血氣不調平常服只用本方春
加當歸夏加芍藥秋加川芎冬加地黄各一兩半日
二三服妊娠作惡生寒面青不思飲食憔悴加陳枳
殼白朮茯苓甘草產後敗血築心地骨皮芍藥潮熱

黃芩地骨皮柴胡咳嗽桑白皮半夏生薑人參甘草
北五味子地骨皮損孕下血不止頭疼寒熱耳鳴氣
血勞傷所致黃芩荊芥生地黄生薑赤芍藥虛寒潮
熱柴胡地骨皮白朮茯苓甘草秦艽知母黃芩麥芽
貝母人參烏梅棗子心腹脹滿枳殼青皮虛汗麻黃
根產後潮熱白朮柴胡甘草牡丹皮地骨皮有熱黃
芩汗浮麥腸風下血槐角槐花枳殼荊芥黃芩大腹
皮紅內消地榆石楠皮白鷄冠花為散煎一半為末

空心鹽湯舊酒調下鼻衄吐紅竹青蒲黃藕節半夏
丁香呵子桂花紅棗飛羅麴白茅根蚌粉奶癰連翹
茨菰子紅內消白芷菰片荊芥牛膝山蜈蚣乳香沒
藥漏蘆生地黃血風兩脇築心痛或盤腸成塊大黃
草撥乳香動胎漏下不止黃耆側柏阿膠甘草續斷
平常經血淋漓不斷或多或少或赤或白非時漏下
可多服有効月水不通野苧根牛膝紅花蘇木舊酒
同煎臨產小腹緊痛紅花滑石甘草燈心葵子便閉枳

殼大黃荊芥黃芩青皮滑石木通瞿麥海金沙山梔
子車前子安胎及胎漏下血阿膠大艾甘草蒲黃炒
過產後腹痛血塊攻腸大艾沒藥好酒產後病眼北
細辛荊芥羌活甘草菊花木賊石決明草決明女人
赤眼頭風疾薄荷清茶赤眼生風防風黃芩產後浮
腫氣急腹大喉中水雞聲牡丹皮荊芥白朮桑白皮
赤小豆大腹皮杏仁半夏馬兜鈴生薑葱白薄荷月
水不調血崩或多少前後嘔逆心膨陳艾黃耆血弱

生風四肢痺痛行步艱難乳香人參沒藥射香甘草
五露子羌活獨活防風荆芥地龍南星白附子澤蘭
為末蜜丸木灰鹽湯下血氣膨脹甘草木香枳殼馬
兜鈴芎藭紫蘇藿香地黃空心服補血住崩百草霜
敗稜灰苴綿灰蒲黃炒過龍骨白薑血成塊地黃藕
節黑血片人參白朮血片人參白朮血片龍骨青黃
木瓜五色生麝香好酒鮮紅溫酒鹽湯風瘡赤腫荆
芥牛旁子何首烏甘草防風羌活鹽酒帶下肉桂蒲

黃百草霜甘草黑豆白朮玄胡索白薑龍骨空心鹽
酒血寒甘草烏梅紫胡桃柳枝感風勞嗽款冬花知母
阿膠半夏麻黃甘草馬兜鈴黃芩杏仁紫胡殭蠶訶
子烏梅月經久閉肉桂甘草黃耆薑錢棗子木通紅
花大便下血四肢寒膨脹及胃腸有風槐花枳殼漏
蘆荊芥木香白雞冠花木通紅內消紫草石榴皮陳
皮黃芩青皮甘草白茅根槐角虛瀉人參川芎白芷
蒲黃炒阿膠白朮茱萸續斷乾薑黑附子肉桂黃耆

赤帶白芷甘草蜜丸鹽梅湯下白帶用龍骨酒煎產後
痢後風乳香龍骨茱萸木香肉桂蒼术牡丹皮白微
人參甘草澤蘭大椒茴香煉蜜為丸木瓜酒下治帶
下赤白痢陳米飲心腹膨炒薑酒血氣艾醋湯渾身
勞倦為末炒薑陳青蒿鹽和調下虛證四肢黃甘草
牡丹皮澤蘭白薇蒼术桂心茴香蜜丸鹽湯酒下嘔
逆飲食不入加白术丁香甘草人參硝砂益智仁胡
椒經行腹痛腰痛芸臺牛膝紅花吳茱萸菴藺甘

草銀器燈心熟服虛渴人參甘葛烏梅瓜蒌根受胎
小腸氣痛木香銀器胎前嗽枳殼甘草款冬花知母馬
兜鈴半夏木通苧廬人參苦參麥門冬脚腫大腹皮
赤小豆茯苓皮生薑皮產後不語失音可子人參砂
蜜百藥煎陰陽交合經脈行赤石脂黃耆肉桂百草
霜敗稜灰肉豆蔻當歸木香龍骨白朮茯苓地榆藕
節胎氣衝肝腰脚痺行步艱難枳殼甘草木通連翹
荊芥地黃羌活獨活山梔子燈心空心服氣築小腹

痛玄胡索煎服

陳氏經驗方吳與周端仁郎中頃

赴省試照矚一隣云某本醫家凡婦人百病只以四物
湯加茱萸無不効者產難及胎衣不下子死腹中入
醋同煎凡用有効謹以此為報此藥不知起於何代
或云自魏華佗佗之術精微方類單省傳稱佗鍼灸
不過數處千金方云自三代以來醫方藥論未有如
此詳備其間有漢晉名公諸方金產寶方仍朱梁節
度巡官咎膺所撰其中有四物散後修入聖惠方自

後醫者易散為湯善用者若馭良馬當隨意無不得
所至皆然名醫於四物中增損品味隨意虛實寒燠
皆得其効者然亦非止婦人之疾可用而已

交加散

出大全良方

治胎前產後百病婦人營衛不通經脈

不調腹撮痛氣多血少結聚為瘕產後中風尤妙及
肌體黃瘦氣短羸怯

生地黃

一斤研取自然汗

生薑

十二兩研取自然汁

右將地黃汁炒生薑滓生薑汁炒地黃滓各稍乾焙

為細末每服三錢溫酒調下尋常腹痛亦宜服產後
尤不可缺一方或男女血熱心煩產後傷風以荊芥
煎湯調下

普濟方卷三百二十七